

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院解驗奇效良方大全卷之六十四

和說

書云陽升陰加四序無差萬物稟天地之一氣男女從精血之
在百日名姝星至半載而為誇乳童週期而陰陽各半孩兒千
日乃真氣方著此際全在乳母能調則和不調則遠且和者其
母慈祥能調寒暑乳哺得宜是以百病頗釋形貌充悅筋骨
盛情性異常遊者乳哺失節不能調攝或嗔如
或酒醉乳兒令兒驚癇或有孕乳兒令兒黃疸
允令兒患驚風異疾或吐後乳兒令

令兒多熱喘急或痰癆未定

睡口鼻之氣侵穴顛門令兒鼻

加大拱熱氣鬱積令兒患熱病風

衣服晉於月下牀眠過夜被

疾或將惡相異物嬉戲下忽

無辜以為決童子未成見稀物

精損血形體黧黑四肢枯痺病之生

載其說乳下嬰孩之疾有病難治者以無所據中古巫妨氏著

顛顛經以占壽夭歷世相授於是小兒醫方興焉其次晉宋江

左推譜蘇家小兒方傳習有驗隋間有巢氏方撰集病源唐有

孫真人晉心此術造後賢俊羣集名醫頌衆然小兒治法散在

諸書傳考群書論說但有證而無治法張煥有方而闕脉證惟

錢氏一書古今所重謂小兒方脉固難求證不可以言語取者

乳下之嬰襁褓之孩故事於一科古之有言醫之為難而慈幼

科比諸醫者又出人一頭地雖然人有長幼病感則一但幼小

不能言者耳人有四百四證能調則生失和則死幼者歸罪於

母生者或四氣七情或飢飽勞逸或嗜慾悞犯皆能成疾故上古神農氏之王天下也觀人之遠和製草木之味以定醎酸甘苦以治疾病沉痾醎以軟之酸以收之甘以緩之苦以堅之奇哉辛味摠攝四傍然後播種百穀以養人之形骸古者巢居穴處不昧其道故能全形返質以適自守氣血堅剛終保百年之壽於是乎明醫間出繼踵不絕岐和振袂於前李華馳聲於後悲哉後人巧偽日增故此天壽不滿雖有明醫續世診視無功淫祀妖邪以求餘福可謂息燈覓朗拈壑駕舟雖欲求生反遭艱險大抵養生之士要識遠和之理則天命無窮矣

○小兒初生總說

夫人稟陰陽二氣而生得患起自三焦冠壯易明童幼難治古云不能察其幼小者是以別為一門調理耳小兒所稟形質壽命長短者全在乎精血在母之胎中十月

而生一月如露珠二月似桃花三月男女分四月形像具五月
筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒
能動右手九月三轉身十月受氣足又顓顓經云一月胎胞精
血凝也二月胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄
五月五行分五臟六月六律足六腑七月精闕竅通光明也八
月原神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足
萬象成而生也大抵壽夭窮通聰明愚癡皆以預定豈能逃乎
小兒所稟全習父母之餘氣以長形質故肥不可生瘦瘦不可
生肥大小與父母不等則難養也初生雖多患若形骸相稱則
壽也小兒回舒轉首遲滯稍費人雕琢者壽之兆也若小兒預
知人意身輕力懦者難養也古人有言譬如梅花早發不覩歲
寒甘菊晚榮終於年事故知晚成者壽之兆也若小兒陰大而
黑與身相等者可養之子若陰小而白者難養也若小兒形骸

弱頭面多青脉精神昏痺者難養也若小兒剛悍眼目俊朗神氣爽健髮紺而澤者壽之兆也若小兒精神實則少病故易養衰成也若形瘠而多病者難養也若小兒眼內黑珠少白睛大面色皯白者非壽之相也縱長不及天年若眼中黑珠大而白睛少面色黑形不淡者亦要觀其小兒眼中黑白分明表裏相稱曰壽曰康若黑珠動搖光明閃爍縱長亦憂目疾壽亦不及四旬矣凡嬰孩始生坐臥急以綿裹指拭兒口中惡物令淨方可浴穢若不急拭啼声一出嚔下則生百病矣如或浴水未到且以綿絮包裹煖大人懷中浴湯極須調和若冷熱失所則令兒驚亦致五臟疾矣雖浴出亦當煖之若過暑月亦未可去其綿絮不出母腹不可令冒寒氣也宜以預先煎下沸湯以瓶收之臨時漸煖不犯生水則兒不生蒼如此一月為佳自然長而少病矣初生小兒未乳之先用黃連與少浸汁調乾臙脂一塊

穀抹兒口中去其腹中旧糞方可與兒乳之一日內以少礞砂入蜜與少調灌半蜆殼一膈以牛黃少許徐徐抹兒口中若兒多睡煩勿強與乳之新生浴兒用猪膽一枚取汁和入湯中浴兒則終身不生瘡疥又用五根湯浴兒亦可五根者挑柳棟梅槐加之苦參白芷煎湯浴之辟諸不祥大凡小兒冬不可久浴浴則傷令夏不可久浴浴則傷熱頻浴則背冷而發驚若遇熱時以軟絹蘸湯拭之小兒肌膚未成不可煖衣煖則令筋骨軟弱時常宜見風日若愛惜不見風日令兒肌膚脆軟便易傷損當將父母穿過旧絮著衣少假父母之餘氣幸勿以新綿著兒體其天氣和煖無風之時令人抱向日中嬉戲數見風日則血氣剛肌膚堅密堪耐風寒不致疾病若藏帷帳之中重衣溫煖譬如草木生於陰地不見風日軟脆不耐風寒又當消息衣服無令衣多多則令兒汗出汗多則致虛損風邪易感凡小兒

當慎風池在頸項筋兩轅之間諸疾從此而發小兒臍帶不結不可頻浴頻浴則臍中入水撮口臍風背從此起不可不慎此刀前人之成說實後人之龜鑑者欽

○看小兒三脉五脉法

水鑑先生曰小兒雖受陰陽二氣成其形氣尚未周何言有脉直至交蒸候盡陰陽氣足方可看脉其髻鬘之年方生陰陽古云男子七歲曰髻生其原陽之氣女子八歲曰鬘其陰陽方成故未滿髻鬘之年呼為溥陽若髻鬘滿後呼為童兒始可看脉小兒初生至半歲之間有病速看額前眉上髮際下以無名指中指食指輕手滿按之若三指俱熱感寒鼻塞氣喘三指俱冷上吐下瀉若食指熱胃堂不寬無名指熱乳食不和以致病也半歲已上方可看虎口週歲已上看虎口兼一指脉若五至六十四日裏蒸滿足只看一指脉以食指按之上下衮轉分候三

部凡言三部非寸關尺也小兒三部面看其色為一部虎口脈
紋為二部二指脈為三部五脈者上按頤前下按太衝并前三
部共為五脈小兒有疾病無惡候不必常診太衝之脈此脈足
生死之要會如七八歲脈一息六至為常人之脈一息八至為
熱九至凡五至虛四至損三至脫二至死十至必是病勞虛損
形容瘦劣若或體肥面色青白一息十一二至謂之盛是凡病
死是為脈亂若一息一二至者為脈不來其人常厥冷而死遲
若一息十一二至者必死速則不滿三月何謂一息一呼一吸
為一息呼吸者即是出一氣入一氣謂之一息其脈若指下來
硬隱指急大者是有積若來微細即是冷若輕緊即是熱虛時
復一大即是人驚若大小不勻即是惡候也所論浮數為熱伏
結為寒沉細為冷大小不勻為惡候數者緊也浮者輕也伏者
貼也重乎方見結者亂也沉者重沒沉細者微也大小不勻即

是或大或小而不勻是謂氣不生其人必死也且如前人備述
三脉立脉之法書之于左後季將此不可視以細事人命所繫
務要誠心診察兢上業上庶幾則可設有所誤禍之不輕醫為
人之司命可不謹乎

○辨虎口紋訣

夫小兒三歲以前若有患須看虎口脉次指表節為命關次氣
關次風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也
男子以左手女以右手觀之

有此通變三關脉候是極驚之候必死餘外並可醫治

山 風關青如魚刺易治是初驚候黑色難治

氣關青如魚刺主疳勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳肺難治

風關青黑色如懸針主水驚

氣閉赤如懸針主痺熱肺臟積熱

命閉有此凡五色皆是死候三關通度如懸針者主慢驚風難治

水

風閉如水字主驚風入肺咳嗽面赤

氣閉如水字主膈上有涎并虛積停滯

命閉如水字驚風痺證夾驚候不拘五色三關通度者難治

乙

風閉如乙字青黑色主慢脾風難治

氣閉如乙字主驚風

命閉如乙字青黑色主慢脾風難治

弓

風閉如曲虫者痺病積聚脊前如排筭子肚皮如吹起

氣閉如曲虫主大腸穢積

命閉如曲虫主心臟傳難治

〇

凡關如環主肝臟并有積聚

氣關如環主肝入胃吐逆不治

命關如環難治

〇

此紋若在風氣二關易治若在命關通度難治

〇〇〇〇〇

此紋若在手上一或在面上或左右臉邊皆是死候

八

脉曲向裏者是氣痺

脉曲向外者是風痺

ノ

脉斜向若是傷寒身熱不食無汗

脉斜向左是傷風身熱不食有汗

〇

双勾脉者是傷冷

〇

脉三曲如長虫是傷硬物

〇

脉兩曲如鈞是傷冷

〇

脉一頭如環又有脚者是傷冷

双

頭面肚上有大脉并青筋並是食毒

驚積難一

●●●

面上有此點子並是再發之候

災

脉如亂虫是常疳亦有虫疳蛔虫食積之疳治之必瘥

凡脉不足細者並是風氣但消疳然後取虫為効

一風易治

二氣

關病深

三命關死候

小兒驚風脉候

命關氣關風關



青色天雷四足驚

赤色飛禽因外入

黑色只因遭水撲

風關候脉應心經

◎辨三部脉證

上黑須知腎臟傳

中關黑候又纏綿

入驚此患兩相雜

目多直視定痰涎下脉

下黑頤知是再驚

但宣風積便和平

上下是同因打撲

熱來悶閉沒心情

上青肝臟有風停

目直便青面更青

中是人驚并四足

渴來發燥不惺

下青原是再驚根

解熱宣腸是何論

上下俱青候是惡

十箇之中得二存

上赤風多入肺停

或來發熱嗽聲頻

中是風來入心臟

腸痛頻頻下瀉青

下赤重驚見本宗

但調心臟有神功

上下一同難治療

口開目下是知凶

上青肝臟本因留

目閉身疼四体柔

中是水瀉并再撲

熱來喘嗽不知休

下條

下青因是再驚來

妙藥宣風定少災

上下若青俱發熱

四肢逆冷奄泉臺

上黑之時目上瞪

乃眼

大便流糞又黃青

中見之時狀消渴

下熱尿黃便安寧

下黑若見赤相隨

氣多下瀉候如斯

針下

上下俱同須看手

虛煩燥渴速求醫

○再看三關脉色細訣

上關見此脉是心之候也轉瀉恐虛而生風痰俱

下鎖心

中關若赤便多風熱

又下

下關若赤發熱大腸閉結

候

上關見此黑脉是腎臟之脉為順若是大腸秘澀生風之候也

下

中關黑脉生風之候不為惡候

下中

下

即寒若自瀉足陽冷

只下

不得轉換

下

上關若見此脉四肢逆嘔吐加喘者惡候吐喘定生候

下

中關青脉風搏觸心急与治風即瘥

下烏

下關青脉若見無候即不宣轉上虛中俱同四肢熱為和四肢逆

或候也青上關黑并眼下黑量生未滿二歲得此脉与候者及大腸

流或身体壯熱全者須渴若下發熱或無渴与解之瘥先下天

後下珠

黑脉錯亂者腹脹是候或下痛即是積候下宣凡九散以

一日赤脉亂者是打撲息下驚九散脉透中關立變風候

忌下宣藥傷虛動脾臟生逆吐者玄候用勻气散補虛

如第一日便見此脉三關都見是五臟之應患若第二日

中關部隱上或下見尺中關見者多气候若三關都見或隱上

或面浮者是精气候常隱上者不交出沒數旬而死

如左手上部脉曲歸裏者是傷積下曲歸外者客風觸

之即發搐也下驚中關若歸裏者是客風傳變下曲外

者凶候曲候過命關并外有惡候起者凶候

上關脈亂者傷令之患下均中部脈亂凡者傷熱傳風

盛之疾下烏下關若亂急須下溫脾臟若下進食似凶

此兩雙指關若見青与赤相雜如紫色無黑者惡上關脈

見傷寒必發咳嗽須解表微上浮入中關是風候下清下關若

見頻退為吉不退為凶候若孩童從氣關傳至命關方可調治

已上秘訣為神聖之醫也此前人消息後之孝者宜細推之

左心小腸肝膽腎

右肺大腸脾胃命

孫華二真人曰凡小兒左手見右手脉逆惡也右手見左手脉

為逆惡候也此陰陽定之而决生死何况虎口脉平五歲已上

至十歲已下自斷乳而進食陰陽備矣故可善一指而定三關

分寸關尺象天地之九候也

○正定三十一般死候不活

凡小兒病鳴聲放黑黃青膿手攣衣縫目多直視語帶喘息人虛笑覆面向地啼哭無淚目無精光四肢就頸足外藥到口不納四肢卧地變如汗出如珠擗眉咬指甲引身長吁出氣變哭冷水脚曲如鉤反張不已言語聲震魚口吐舌出唇黑久患唇紅下氣無定久患愛哭泥土服蠟脾瀉變病成赤紅更有無華之疾候是也

○辨孩兒生下三臍已前中病不治

風禁

猢猻瘰

臍風

撮口

咳嗽

伏舌

木舌

重齟

解頤

項強

育高

○變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未具全自生之後即長骨脉五臟六腑之神智也變者易也又生變蒸者自內而長自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變變每畢即情

性有異於前何者長生臟腑智意故也何故三十二日長骨添
精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二
十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百
二十段為一變亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齦上作三十二
齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日
即至長二十八齒已下倣此但不過三十二之數也凡一周變
乃發熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃
金而未壯也故初三十二日一變生腎志六十四日再變生膀
胱其發耳與髀令腎與膀胱俱主於水水數一故變生之九十
六日三變心喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚
心為火火數二一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變
生膽其發目不閉而赤肝主木木數三二百二十四日七變生
肺聲二百五十六日八變生大腸其發鬢熱而汗或不汗肺者

金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃
其發不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也
太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脉手足
手受血故能持物足受血能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一
歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可別治是
以小兒須變蒸然齒者如花之易苗所謂不及三十二齒由變
之不及齒當變日相今年壯而視齒方周觀諸變蒸執作驚
煩視日角左邊眉間脉紅是也大凡初蒸見一條長一二分在
眉上者輕自日角垂至眉上此重變蒸發熱見二條紅者兩三
次蒸熱在內不解脉紅滿又因驚而蒸脉青亦蒸多次青在左
大陽因傷風而蒸自信門青至眉之上因驚而蒸三處皆青三
證俱見若及三十二齒者變蒸足也此篇載之於錢氏之書書
之於右使後人易於便覽云

○小兒諸熱須分主治

驚熱 溫壯 壯熱 胎熱 脾熱 風熱 煩熱

潮熱 積熱 虛熱 實熱 疳熱 血熱 骨蒸熱

夫小兒驚熱者，候因驚着熱，以為常致令心氣不和，身體微熱，睡驚盡驚，遍身有汗，甚者手足掣縮，變成癇疾。此由氣血不和，實熱在內，心神不定，所以發搐。又小兒交蒸，亦微驚，所以然者，亦熱盛故也。治之以七寶散、天竺黃散、甘露散、辰砂金箔散，皆可治之。小兒因驚則生熱，上則心不寧，故睡卧不安，身體慄動。心主驚，實則發熱，飲水虛則卧而悸動不安，此其候也。小兒溫壯者，由胃氣不和，氣行壅塞，故蘊積體熱，名曰溫壯。若大便黃臭而黃者，此腹內有伏熱，以四順飲子治之。若糞白而酸臭，則挾宿食不消，當服消積丸。輕者少服，重者節乳哺，增加丸藥，當取微利可也。

小兒壯熱者因五臟生熱熏動於外故身體壯熱大抵與溫壯相類而有小異但溫溫然不甚盛是溫壯也其壯熱者一向熱而不止甚則發驚也以七寶散大黃朴硝湯皆能治之

小兒胎熱者但看初生下肌膚紅白二臟已後遍身黃腫眼閉不開依此聲此因胎內有熱或因母服熱藥所致亦謂之血瘡治之以辰砂金箔散牛黃膏乳上吮之兼以黃蘗皮煎湯浴之此良法也

小兒脾熱夫弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊時上舒舌治之便不可用涼藥下之少與龍腦飲子地黃膏治之若大病未已弄舌者凶學者慎之

小兒風熱若身熱面青口中亦熱煩叫不時有風證者宜虎睛丸天竺黃散治之若熱甚大便秘澀者四順飲子亦可服之小兒煩熱者由臟腑實熱血氣盛表裏俱熱則苦煩燥不安反

膚壯熱也。以八珍飲子七室散皆可服之。小兒手足多熱心煩燥哭唇深紅飲水不止以竹葉石膏湯加硃耳露散治之。

小兒潮熱者時間發熱遇時即退來日依時而發此欲發熱也。大抵血氣壅盛五臟驚熱熏發於外故與溫壯相類或來伏熱或帶宿寒夾伏熱者大便黃而臭帶寒者大便白而帶酸臭氣皆緣臟腑冷熱之氣俱盛腸胃蘊積故也。治之以金連飲劑効湯加硃耳露散過期不解小柴胡湯或竹葉石膏湯也。錢氏云假如潮熱是一臟實一臟虛而內發虛熱也法當補母而沉本臟則愈且如日中發潮熱者是心虛也肝為心之母則宜先補肝。實而後瀉心上得母氣則內平以潮熱愈也。醫見潮熱妄謂其實乃以大黃朴硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁約而津液內竭縱取一時瘥鮮有不成疴病而身瘦也。

小兒積熱者由表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便

焦黃先以四順飲子三解牛黃散利動臟腑熱即去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用惺惺散或紅綿散表熱乃去表熱既去又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以為不可醫誤致大傷者甚多此表裏俱虛氣不歸原而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用異功散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身軀便涼熱盡者辰砂金箔散治之錢氏白朮散亦可

小兒虛熱者因患後下復血氣未勻四軀羸弱時多發熱治宜調氣補虛其熱自退如錢氏白朮散異功散加四均子湯之類或未退人參生犀治之此為良法

小兒實熱者頭昏煩赤口內熱小便赤澀狀如豆汁大便堅鞭或秘澀不通腹急此熱證也宜四順飲子大黃朴硝湯八珍散畧移動臟腑即安

小兒疳熱者發熱形瘦多渴喫食不長肌膚者為之疳熱三四歲後有此疾蓋喫食則有疳用金瓜丸五蟾丸肥兒丸之類治之最為穩當

小兒血熱者每早食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或為疳熱此血熱證也宜服龍膽丸地黃膏之類時與服即瘥

小兒骨蒸熱者一歲至十歲衣絮皆不得着新綿又不得冬月以火烘衣被勿令食桃李楊梅果實又不得食炙燂熱炙之類皆令兒體熱或因傷寒後食肉太早令兒體熱者有之或作骨蒸者宜服生犀散克効湯地骨皮飲七寶散金連飲子治之蓋小兒純陽未有虛羸形察之證溫補之劑寡矣且如前人論小兒發熱有一十四證見證立方多獲功效今人當効前人之心觀形察色切脉論證以分表裏虛實設有所悟非惟天關人命抑且欺於心哉

小兒初病先見面部與虎口之脉色吉凶相合

面部圖形



立夏 穀雨 清明 春分 驚蟄 雨水

腦背圖形

百會穴

凡驚風後或百會穴下有
此三條脉青下對耳尖名
率谷穴久愈青者不治也

路母血怯弱也

後天陰



○虎口脉色

脉色純紅者為初得病 為陽 為熱 為病在外

脉色紅而紫者 為病傳變 為內 外尚有熱或但熱為陽

脉色紅或紫而青 為病荏苒 為病一寒一熱外為之變作

脉色純青者 為病久而過經 為冷 為熱在內 脉色青而黃為病

變熱 為冷 則實力為虛寒 則變熱 則為五臟之邪相干陰陽之證相反

脉色青而黑 為病極 或為久病再作形色黧黑

脉色黑而黃黃而露出者十無一生大凶

○面部

赤紅乃心氣絕蓋火屬心主炎上故知心絕則死

主咬牙 弄舌 虛舌出 滿口生瘡 木舌 鵞口

喉閉 舌上白胎 舌下重吊 咽喉腫爛 痰涎上壅

魚口 此為色急惡候

左太陽并日角

紅脉現變蒸候

主煩躁啼叫頭肚上溫溫壯熱一二日而退

太陰上紅脉現傷寒之候

主壯熱鼻塞

文臺上紅脉現傷寒三日餘

主內熱頭疼

太陽脉紅至太陰

內外有熱

又連文臺熱極不解至武臺

漸生變證

顙門紅脉胎受熱受驚之候

主不時驚跳時多啾唧夜啼難睡

額上紅脉至眉心驚風發熱之候引入印堂驚痰搐搦有熱主

小便澀少

印堂紅脉現心經積熱眉心連印堂紅脉或紅影心肝上焦熱

蘊痰涎上壅貫上焦夜啼將生驚候近眉頭左下有西

伏驚時睡中驚跳

顙門紅脉腫凸此風熱痰生驚正緣熱氣上衝攻急心胃有熱

痰不止漸成驚風之候以涼劑去痰解熱即安如顙門上紅脉引入印堂此驚候搖動多日子

左眉頭紅變赤熱未退肝肺有熱之候當以清肺疎風熱正胃氣之劑

風池紅有風熱在上中焦瞬息將有搖動之候驚風吐痰氣池紅傷風久傳變在臟三焦有熱之候可頻解利

眉心印堂紅有熱驚發飲不吐則成驚搐

印堂至山根紅脉是心與小腸熱候小便赤澀而少

山根下至鼻柱紅心胃氣候小便連大便皆赤澀

印堂連至上準紅三焦有積熱可以清涼之劑過之

準上紅黃色此平穩無恙

顙門紅脉外腎因風溫候生熱為吊

臉堂紅內有煩躁而熱

右太陽并日角紅脉因喫乳母傷風壅妳汁 成乳癖停滯生

○風熱痰等證

右太陽紅脉喫乳母熱病痰妳 恐生痰候引入

武臺紅脉漸成吐瀉生驚之候

風池紅母不思餅姜麪或狼羊骨汁毒生風

氣池紅母有熱痰乳兒雖至十歲病亦須發見此熱痰乳入兒

○五臟令兒眼目生昏傳變他病

頤門紅腎中氣病緣母能飲或好異物及食鷄鵝鴨子生魚莖

絲將來傳變異疾

七表 浮乳滑實弦緊洪

浮主中風乳失血 滑吐實下分明別

弦為拘急緊為寒 洪脉由來偏主熱

八裏 微沉緩濇遲伏濡弱

逢寒緩結微為痞 瀉脉敗血濡氣滯

伏患癰痛沈積冷 弱因患後虛浮是

九道 長短虛促結代牢動細

脉長陽毒在三焦 短脉胃中食不消

虛主多驚入恍惚 促時加峻命難逃

結為氣痞代羸瘦 牢者骨蒸似大燒

動則血崩精不固 細還瘦胫主枯槁

○視嬰孩大要

一視兩眼精神 二視聲音響大 三前後頂顙 四形貌

五毛髮

一兩目為五臟精華所聚一身之神氣所鍾若精珠黑光滿輪
精神明快主兒有壽一生少病雖有病亦易愈若眼白多
睛昏顙睛珠或黃或小此是稟受怯弱兒多患也

二声音大而響亮五臟之氣壯令兒易得長浪如孩兒自生未
不曾大啼哭乃声音不出此乃一臟或二臟之陰竅不通
神氣怯或叫聲如啾唧伊喚之狀此兒不壽而難養必矣
三顙門乃母氣血充實令兒顙門堅實而耐養如母多病氣血
怯弱令兒顙門虛軟而不實又後頂顙乃父之精元氣充
實令兒後頂上堅硬而耐養如父之原氣不足耽酒多慾
令兒後頂虛孔不堅亦不壽如父母俱怯生下兒女俱不
壽若如此其父母自亦不能保於天年前顙又曰信門道
家為泥丸後信名腦後頂門頭中心頂上又名百會穴華
陀者面部訣載甚詳顙字信同音凡前後信及百會開而
虛名解顙

四鑿髡口大鼻端眉聳目秀方福此嬰孩易長福氣堅厚如口
小鼻塌眉目醜陋令兒性異不貧則夭亦是乖離此甚難

剖決

五髮乃血之餘母之血氣充實則髮黑而光潤如母因血虛帶漏敗墮月事不調或耽酒多淫或母胎有患令兒髮黃焦槁生疔熱瘡癰之患

凡視小兒神氣色脉無出於此五者不能全見但得兩目精神聲音響亮此可保其六七此乃漢東王氏之心法口授之秘訣也

○驚風搐不洽證

如驚風搐搦客定精神如常神思不改即是燥冒煩躁不安須急急調理稍緩則不及事亦懼不療須要兩眼鮮明為吉其餘難療之證須詳細審察

敬嵐搐搦兩眼不開不洽 驚風定了兩眼亦開不得不洽
叫不出說不得更不啣聲不洽 驚風連搐不止不洽

手按胸膈及咽喉間不治 口中不時吐出鮮血不治
吐不出者不一月死 信門腫起紅青脉交橫見不治
大便瀉紫黑血不治 信門如坑陷青脉現不治
驚風搖動連日不下不治 尋常無事時噤口噤眼連日不語
痰涎滿口咽喉間如解鋸不治 痰涎如水鷄聲乃二氣爭不治
聲音不出口不治

○驚風治證

諸方書所載急驚風易治慢驚風難治此古今之通論也意之
度之出自至人傳授別是一涯機杼精思其訣錄方術真神仙
之妙旨也有若小兒授病之原即驚風寒暑痰食各有由碼若
治療之法迥出一人頭地如寒屬膀胱驚熱屬心風屬肝痰食
屬脾胃究湯氏幼幼之說驚風痰常相繼於表裏大要察其部
位脉色燭見其病之底蘊克時獲效矣

○驚

脉左額門額上印堂三處一紅嫩則初驚方熱紫脉則重驚

而熱 額門屬腎 髮際屬膀胱 印堂屬心

額門先紅及印堂青此心之微邪淫水 額印皆紫紅此同前

上證皆輕 額門青及印堂紅此腎之正邪尅心大必危

額印皆青同上證病危 如加之左太陽上紅傷風內熱

日角紅至眉中變赤兩熱生驚 右太陽紅食了乳母傷風乳汁

右太陽紅青喫乳母傷寒乳汁

○風

脉看左太陽及風池 左太陽與風池紅風邪輕 青受風邪

重左太陽屬膀胱 左太陰屬腎 左風池屬肝 右風池屬命門

加之又看左太陽紅傷風初熱 左太陰紅感寒初熱

左文莖紅熱有五七日傳經了 左太陽紫傷風再受

左太陰紫傷寒再得 左文臺紫三四次熱了

右文臺紫久熱不退 左太陽青風變熱 左太陰青生微為了

左文臺青并傳經熱不解 印堂紅主風熱生微為

○痰

右太陽屬三焦 右太陰屬脾 右文臺屬肺 右武臺屬胃

右太陽紅喫母感冒熱妳 右太陽青喫母感冒熱妳

印堂青 右太陰青 右文臺青此三處主痰與食

印堂紅心熱生痰 印堂青黑主胎中驚痰飲

印堂紫主有熱痰 印堂青黃主有風痰

右太陰青紫傷寒夾風熱妳 右太陰青傷寒妳

○食

右太陰青 及文臺青 武臺青皆是食

如食傷因飽食不節或為冷硬之物或油膩之物致令頭

寒發熱嘔吐宿食肚寒如傷在膈上痞塞者葱蘆散吐之
停於肚中嘔吐肚寒宜用三物湯瀉之

有滯食緣胃弱尅化不迭心胃滿閉肚疼與化鐵丸消食
二陳湯快膈有中食因其兒脾胃法常有停飲或食飽兼
飲滯而不化痞塞三焦如驚風搐搦或迷悶而不省似夢
如醉神思昏亂發熱金星丸主之

○五癎附症

風癎為病駢手足或一手一足或兩手兩足如癱不隨或噤眼
或噤口或口喎牽引頰車

食癎為病傷肉食手足搐動角弓反張或拳攣或張狂大聲如
羊如犬大叫吐出血飲食方定其飲食盡被痰涎包裹在其中
驚癎為病廢頭目吊口目或一目雙目或昏或盲或邪視或頭
喎或推頭或戰腦

癰癰為病此患似張狂作之不常或半年一作或一年或一月
或一日一次或一日三次一身驚搐不廢手足不廢頭目
其人張狂如夢中如半醉燈下不知人皆從夢寐中作所
以無常也忽耳不能聞其目不能視如狂

癰癰為病此患喫食不知飽忽然連三五日不甚思食手足搐
動多自夢寐中作食之大飽亦便發作

○癰附癰

若癰病如寒邪中得患者十有九死

又熱瘟病及中暑發熱者十無一生

頭疼發熱頭項強硬不能回顧搖頭口噤問之全不應人
漸漸角弓反張痰在咽喉響者死仲景以薑黃根湯小續
命湯入麝香方大防風湯主之且小方脉者書立方者一
百餘家各有所長惟錢氏比諸家優誅之切後之學者熟

讀玩味治嬰孩之疾則百發百中矣今畧各證通治方列于後

○小兒證通治方

七寶散治小兒溫壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱晚涼此藥
凉心臍消風熱

川大黃 蒸

赤芍藥

甘草 炙

川當歸 各二錢

麻黃

白朮

荆芥穗 各二錢

右為末一歲一錢永半盞葱白一寸薄荷一葉煎至三分
不拘時溫服

天竺黃散治小兒驚風熱

天竺黃 研

川葇金

山梔子

白僵蚕 炒去絲

蟬殼 去土

甘草 各等分

右為末一歲半錢熱水薄苴湯皆可服不拘時

甘露散治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心腑止煩渴安神穩

特加硃砂名加硃甘露散

寒水石研軟而微青中石膏研各二兩堅白有偁壁

生甘草末一兩

石件為末和勻量兒大小或一錢或半錢熱月冷服寒月

熱服用薄苛湯調或燈心湯調被驚心熱不安卧皆可服

小便不通快麥門冬燈心湯調若驚熱入硃砂少許不拘

時服一方有赤茯苓一兩蘇沈方用滑石不是石膏錢氏

名玉露散每服一字或半錢或一錢食後溫白湯調下

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不安驚惕煩渴恍惚怔忡

夜卧不安齒斷腫爛及痰實咳嗽咽膈不利

辰砂另研 桔梗各二錢半 人參 白茯苓各一錢半

蛤粉四兩 牙硝錢半 甘草炙一分半 片腦一分

金箔一井

右為末一歲半錢薄奇湯調不拘時百疳小兒臟腑多熱
睦卧不穩大便不利蜜湯調一字

四順飲子治小兒三焦積熱遍身丹腫唇口生瘡忽驚涎潮諸
熱等證

川當歸

赤為藥各二

川大黃

溫紙裹煨香
各二錢半

甘草錢半

右劉碎三歲小兒用二錢水六分薄奇二葉煎八九沸去
粗不物時服大小以意加減與之小便不通加燈心木通
同前服

紫霜丸治小兒變蒸發熱不解反夾食停冷溫壯汗後熱不歇
及腹中有痰癖乳哺不進乳則吐哕食癰先寒後熱者

代赭石

一兩
三五次分服

赤石脂

一兩

杏仁五十粒
皮尖令淨

巴豆三枚

去油

右件研入糊為丸如麻子大一粒少乳下食頃後與少乳勿令多日服二九此藥無所不療雖行不虛人米飲下哥牛黃膏治驚化痰祛邪熱止涎嗽

蕒豆粉

二兩錢氏用

牛黃

另研

腦子少許

甜硝三錢

甘草末

半錢

鵬砂

二分

方珠砂半錢

右為末和勻煉蜜丸如芡實大金箔為衣或一九或半九薄皆湯磨化服不拘

龍服飲子此瀉脾經熱可代瀉黃散用治小兒蘊熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅

甘草

四錢

人抱子

三兩

藿香葉

二兩

石膏一兩

細砂

瓜蒌

各七錢半

右為末每服一錢蜜水調服不拘降治傷寒餘毒潮熱霍汗加竹葉煎服

地黃煎丸治小兒風壅上膈熱煩鼻呬口瘡咽喉腫痛口舌生瘡或血熱五心常熱多渴飲水

生地黄

熟地黄

薄荷葉

甘草

山梔十仁

玄參

片腦

右為末水密為丸如芡實大每服一九白湯磨化乳後服

煎効湯治朝熱往來久而不解煩渴昏倦肌瘦減食

地骨皮

柴胡

防風

黃芩

甘草

葛根

右剉碎每服二錢用水六分煎至三分不拘時服

竹葉石膏湯治小兒虛羸少氣逆欲吐四體煩熱

石膏

半夏

人參

麥門冬

甘草

炙

淡竹葉

北

右剉碎每服二錢用水六分粳米二十四粒生薑二片煎至三分去粗不拘時服

金蓮飲子治小兒蘊積吐熱赤眼口瘡心煩躁悶咽乾多渴潮熱不止

防風

甘草

炙

連翹

柴胡

去蘆

山梔子

各半兩

右為末每服二錢用水六分煎至三分食後服

三解牛黃散治小兒潮熱實熱吐熱煩悶不思乳哺大小便不利及諸風壅痰實

川大黃

溫知果

牛黃

黃芩

白附子

防風

名半

白茯苓

桔梗

甘草

人參

全蝎

微炙

白僵蚕

去絲

鬱金

各二錢半

右為末薄苛湯和熟蜜調半錢不拘時服渾身熱渴吐瀉
用防風湯調若壯熱不止甘草柳枝湯調服

大黃朴硝湯治小兒驚熱涎風前後不通

川大黃

甘草

朴硝

右剉碎每服二錢水半盞入蜜少許煎至三分不拘時服

惺惺散治小兒傷風壯熱及瘡疹毒氣時疫溫壯風熱等疾

桔梗

細辛

人參

白朮

瓜蒌根

甘草

白茯苓

川芎

右剉碎每服二錢水半盞生薑薄苛各少許煎至三分不

拘時如傷風無汗加葱豉薄苛煎服

紅綿丹治小兒急慢驚風手足抽掣目直涎壅壯熱氣癰及胎

癰中風

蝎梢

炙黃

辰砂

牛黃

赤足蜈蚣

天南星

薑汁水片

麝香

各二分半

蛇含石

火罈煎淨

右為末米糊丸如鷄頭大金箔為衣量兒大小一歲半粒

薄苛湯磨化服不拘時

異功散治小兒吐瀉思食溫中和氣凡小兒虛冷病先與數服

以正其氣一名正氣散一方加薯蕷等分又名六神散

人參

白朮

茯苓

甘草

白匾豆

薯蕷

各等分

右為末每服二錢用水六分生薑二片紅棗一枚煎至三

分量兒大小加減不拘時服如虛冷泄瀉加附子風證加

天麻刺加聖藥

錢氏白朮散治小兒脾胃虛弱昏困多睡乳食減少調中和氣

止吐逆除煩渴

人參

白朮

茯苓

甘草

藿香

乾葛

木香

右為末一歲用二錢水五分煎至三分不拘時服

補肝腎地黃丸治小兒肝腎虛怯由胎氣不成面色皸白其顙

即解不語多啼泣畏明體骨重白膜遮睛喜卧冷地

熟地黃

各八分

山茱萸

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大三歲以下每用三五丸白

湯化下不拘時服

人參生犀散治小兒骨蒸肌瘦煩赤口乾日晡潮熱夜有盜汗

五心煩躁四肢困倦及大病差後餘毒不解或傷寒病後

食羊肉體熱不思食

羚羊角

錢

地骨皮肉

秦艽

去土

麥門冬

去心

枳殼

錢炒

川大黃

煮

柴胡

去蘆

赤茯苓

去皮

赤芍藥

桑白皮炒

黃芪

人參

驚風

去腥醋炙
黃各等分

右剉碎每服二錢水半盞烏梅半箇煎至三分不拘時服

地骨皮飲治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷寒後氣未解

柴胡去蘆

地骨皮各二兩

知母

甘草炙

驚風

醋炙

黃苓

人參

各二錢半

赤茯苓半兩

右剉碎一歲二錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服

金匱丸治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久服令兒肥白

黃連

黃柏

甘草

各炙

青橘皮

去穢各等分

右為末入麝香少許攪猪膽汁和入石罌隔湯煮五已沸

掛風處一宿丸如菉豆大米飲下五七丸至十五丸不拘

時日三服

肥兒丸治小兒疳病者多因闕乳與食太早所致或因久患疳

脾胃虛弱動日漸羸瘦腹大不能行髮豎無精神

黃連

神麴粉酪

大麥蘖炒

肉豆蔻燒灰

史均子

去殼焙

木香一錢

檳榔一箇不

右為末麵糊為丸如蘿蔔子大白熟水下三五十丸看大

小增減空心服

五蟾丸治小兒五種疳疾

五靈脂研碎

黃連各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如黍米大以五色為丸一分膩粉為衣一分蜜陀僧為衣一分百草霜為衣一分硃砂為衣一分青黛為衣晒乾和作一處每服三四十粒不拘時來飲湯下目三服

龍膽丸治小兒食後多發熱或夜則涼此血熱證疳熱皆可治

宜黃連

去毛

赤芍藥各半

草龍膽去苗

青皮

去殼

各半

檳榔

一箇大者

藿香少許

右為末猪膽汁少入麵糊為丸蘿蔔子大每服三二十丸

米飯湯空心服

硃砂膏治小兒鎮心臟壓驚驚化痰墜涎除風

硃砂

另研

白礬去 白附子去

天南星去

各

乾蝎

一兩熱不可太過

右件入麝香半錢共為細末麵糊為丸粟米大硃砂為衣

每服十丸煎金銀薄荷湯下如盜汗煎麻黃根湯下不拘

時服

調中散治吐瀉

人參

白茯苓二 丁香二十箇

白朮二

甘草二

紫蘇二

右為末每服一水用木瓜煎湯入鹽少調服不拘時

青金膏治小兒諸疾

青黛

另研

胡黃連

熊膽溫水化開

蘆薈

另研

白附子

麝香少許

蟾酥

水銀各二皂

鉛霜

龍腦許各少

右為末重入乳鉢內研細令勻用獾豬膽一箇取汁熬過浸蒸餅少許為丸如黃米大曝乾器內收密封或用時旋取為丸每服二丸各依後項湯使送下

驚風白湯下二丸 搐搦將一丸溫水化開滴入鼻中待噴嚏即可更用薄荷湯吞二三丸 久患五疳瘦瘠脚細

腹脹肚上青筋頭髮稀疏疎愛喫泥土時咬指甲瘦弱米飲下 瀉痢頻併米飲下 疳蛔虫咬苦練子煎湯下

裏下赤爛口齒疳虫所蝕口瘡並用乳汁化開塗在患處 疳眼雀目取白羊肝一葉用竹刀批開納藥二丸以麻線

縛定米泔水內煮熟令兒食肝恐小不能食乳母嚼與兒
啖乳母用忌毒物薑蒜雞鴨猪肉此藥隔二三日服一次
能除孩子百病

紅綿散治小兒四時感冒寒風通身發熱變急諸驚胎驚丹毒
等熱並皆治之及急慢驚風亦宜服之

人參

錢 天麻

燻 炒

麻黃

全蝎

甘草

辰砂

另研

右件為末然後入硃砂和勻再乳極細每服半錢用水半
盞煎數沸入乾胭脂少許再煎一沸溫溫服不拘時

烏犀丸治小兒驚癇乳食不化內成積聚腹大體小潮熱往來

五心煩熱揉指咬甲蛔虫自利頸項結核肚痛無時遍身

瘡疥小便如癰痂多盜汗嗜泥炭喜甘甜或癰或渴或吐

或瀉或百日內外因吞惡血絞刺啼叫脾部虛弱易為傷

犯故百疾發生並宜服之常服消宿食破帶氣發散癰毒
不可疑藥味純賤煎見已豆可畏不容服明殊不知脾主
甲州萬物發生之原脾積閉飲血榮氣衛寧免寒澁可疾
不因此發生累上用驗告勿他疑

巴豆

一百零八粒並去心慢對上并數得定不可失落
星兒更用瓦瓶香水浸隔以桑灰心緩腹勢在精製
指有不爭准取神功蓋

橘皮

一兩去白切如小指而大片令勻將巴豆拌和
受晚露七夜二件研內文武火炒令黑色取出巴

蒼朮

六兩炙六次濃煎至角水受受太陽七日曬乾入
鉢內微炒透將橘皮同研為末將巴豆入內
內再研為細末

右件為末和勻水浸蒸餅糊為丸如蘿蔔子大量兒大小
加減丸數臨卧生薑湯送下

五癰丸治小兒五癰驚風狂發搐止盛涎潮等疾如尋常涎

盛看緊慢並宜服之不動臟腑養小之家宜預合以應倉

卒其驗如神

皂用

四兩去皮隨碎水五六碗浸拂

白礬

四兩

半夏

洗

辰砂

天南星

各

蝎梢

炒

麝香

一

雄黃

白附子

炮

白僵蚕

洗沙天絲

蜈蚣

大者一洗去

烏蛇

可煨去皮骨

右件為末用皂角膏為丸如未能就加此生姜汁打糊同為丸如葦五十大硃砂為衣六七歲三四十粒薄可湯生姜湯俱可送下不拘時服

神丹治諸癰癩倒便手足搐搦或吐或不吐或喉間一塊痰熱

下方甕有熱炭多日搖冷痰多夜搖若氣血強盛漸上減少或虛弱搖五瀉之虛實邪氣相干有食癰風癰瘰癧胎癰因傷感而得以因驚所得或喜怒而得病狀雖不同且

別其虛實冷熱為大要大抵脉形氣色次於腎中一二有
眼眦陷或如鴨眼牛眼羊眼或眼白紅如血皆不治不能
言聲音全不出口頭青如靛或青脉為頭信腹信陷頭頂
十字開無辜手足俱廢羊眼無精光眼珠平小半眼努力
看人全不動瘡瘻不能言不能行皆不治或吐痰涎或清
或似膠漆在咽喉嗝嗝有聲常上頭目沉重或癢痒繞發
動一日不省人事

天南星

光白大者七箇削作獨兒

硃砂

一兩將細紗填入南星網內

赤脚蜈蚣

七箇去足

全蝎

七箇去毒此二味焙乾為粗咀俱入南星網內

裝滿仍用刻下南星末調封南星口

已上同南星以紙數十重裹了以酒醋浸透於泥地上掘
一穴坑方九一尺四圍排定磚用炭十斤燒坑并磚通紅
掃淨以酒醋各二升潑在坑內却將南星包兒放在中間

更磚蓋定次用炭圍上護之經宿次日取出細切焙乾碾為細末入後藥

粉霜

另研

辰砂

各半另研

麝香

一錢另研

凌霄花

一兩研

針砂

半兩米醋調炒另研

右件各為末和入前藥再乳極細分作四分一分猪心血九一分羊心血九一分羊蹄草根汁為此一分煮黃肉為丸如小棗豆大每三歲兒三十九十歲兒一百九燈心棗湯送下日三服

○諸熱驚

人參羌活散治小兒傷寒頭疼發熱渾身向急時行瘡疹

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

各七

桔梗

人參

茯苓

天麻

枳殼

各五

地骨皮

薄荷

甘草 各三分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參 梗湯治小兒傷風發熱鼻塞咳嗽時行瘡疹

人參 七分

細辛 五分

桔梗

乾葛

升麻

白朮

茯苓

柴胡 各七分

薄荷

甘草 各五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參 清解散治小兒感風發熱頭疼鼻流清涕及溫壯悉治

人參

防風

天麻

前胡

柴胡 各七分

茯苓

桔梗

枳殼 各五分

細辛 三分

川芎 七分

薄荷

甘草 各三分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

人參 前胡散治小兒感風發熱咳嗽

人參五分

前胡

半夏各七分

茯苓

紫蘇

陳皮各五分

乾姜六分

枳殼

桔梗各五分

甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

天竺黃薄荷散治小兒傷寒發熱頭疼寒驚熱極生風咳嗽痰

涎壅滯鼻塞不通

天竺黃七分薄荷一錢

全蝎

白附子煨

甘草各五分

羌活

僵蚕

麻黃去節

一方加天麻防風各七分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分入竹瀝汁半盞

調服不拘時服

白虎湯治小兒復寒熱渴不已

知母一分

石膏洗一分

粳米八分

甘草五分

加人參一分

右作一服用水一鍾紅棗一枚煎至五分不拘時服

人參前胡散治小兒傷寒退餘熱

前胡五分柴胡

半夏湯泥七分

黃苓去心

人參去芦

桔梗六分甘草五分

右作一服用水一鍾生姜三片棗子一枚煎至五分不拘

時服

藿香正氣散治小兒傷寒發嘔

藿香

厚朴姜製

半夏

陳皮

蒼朮

未泔水浸一宿取出甘草五分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

枳殼半夏湯治小兒傷寒嘔者

枳殼去穢

半夏

湯泥七分姜

右作一服用水一鍾生姜五片煎至五分不拘時服

加減建中湯治小兒傷寒自汗常補虛和陰陽

黃芪一錢 白芍藥半錢 人參 熟地黃各七

甘草五分

右作一服用水一鍾煎至五分不拘時服

竹茹湯治小兒胃熱嘔苦汁

青竹茹如彈子大乾葛一錢 粳米四十粒 半夏湯泡七次

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

小柴胡湯治小兒傷寒鼻衄

柴胡一錢 半夏 黃苓 人參各七

甘草五分 加生地黃一錢

右作一服用水一鍾生薑三片紫一枚煎至五分不拘時服

抱龍丸治小兒傷寒溫疫身熱昏睡氣促風熱痰實咳嗽及中

暑沐浴後可服之

牛膽南星二夫竺黃半兩雄黃

辰砂各二錢半

麝射五分

右為細末并草膏為丸如芡實大每服一丸用薄荷生薑湯臨睡化下

○感寒吐瀉通治

藿香安胃散治小兒感寒逆吐瀉

藿香一錢

半夏湯泡已火

陳皮

厚朴姜製

砂仁各七

蒼朮米泔水浸宿一錢

甘草五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服吐逆加煨生薑汁半蛤蜊殼

人參白朮散治小兒吐瀉微熱作渴

人參

白朮

茯苓

藿香各七

乾葛一錢

木香

甘草各三分

加陳皮砂仁

各七分

一各人參和中散

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

益黃散治小兒不熱吐瀉四肢困憊脾胃虛弱

陳皮一錢

青皮

訶子各五分

丁香

甘草各三分

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

益脾散治小兒吐瀉虛弱調理脾胃

人參

白朮

茯苓各一錢

陳皮

厚朴各七分

木香

甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

實脾散治小兒脾胃虛冷吐瀉不止不進乳食慢驚慢脾等語

及治下痢

人參

白朮

茯苓

肉豆蔻煨

薏苡仁

山藥各五

砂仁

神麴炒

麥蘖

扁豆

陳皮

冬瓜仁

甘草炙各三分

木香

丁香各二分

石蓮肉炒去心

陳米四十粒

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

寶腸散治小兒泄瀉腸滑脾虛此藥厚腸胃

茯苓

肉豆蔻

陳皮

砂仁

厚朴姜製

訶子煨

蒼朮米泔水浸一宿各七分

木香

甘草各三分

右作一服用水一鍾生薑三片棗一枚煎至五分食前服

異攻散治小兒吐瀉不思乳食溫中和氣虛冷

人參

白朮炒

茯苓各半

陳皮七分

甘草炙 木香各五

右作一服用水一鍾生姜三片棗一枚煎至五分食前服

人參和中散治小兒冷熱不調上盛下瀉

人參 白朮 茯苓各七 木香 三分

陳皮 當歸 川芎 前胡各五

甘草炙三

右作一服用水一鍾生姜三片棗一枚煎至五分食前服

助胃膏治小兒胃寒吐瀉乳食不化不思乳食脾胃虛弱

人參去芦 白朮炒 白茯苓 甘草炙

丁香錢各五 砂仁各十 木香三錢 白豆蔻各十

乾山藥一兩肉豆蔻四箇

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸用米飲湯磨化

食前服

人參膏治小兒吐瀉脾胃虛困倦不食腹痛

人參

木香

訶子地

肉豆蔻煨

丁香

藿香

砂仁

甘草炙各

右為細末煉蜜九如芡實大每服一九白湯化下不拘時
安胃和脾散治小兒脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿全不思食
嘔吐痰噎逆氣吞酸面色痿黃肌肉消瘦腹脇刺痛泄瀉
不止便利不調

蒼朮

二兩生薑二兩同搗爛炒

厚朴姜製

人參

陳皮去白

木香

藿香

澤瀉

砂仁

廣茂煨

檳榔

白朮

茯苓

青皮去白

甘草炙各

小紅棗

二十四箇
去核焙乾

右為細末每服一錢用淡生薑湯食前調下

○痢疾通治方

胃風湯治小兒下痢赤色肚腹虛滿腸鳴疴痛

人參

白朮

茯苓

芍藥

煨各七分

官桂

川芎

當歸各五分

粟米

一撮

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

生熟飲子治小兒虛積腹肚疴痛下痢赤白裏急後重日夜

無度並皆治之

粟殼

去脯

訶子

煨

白朮

炒

黃芪

煨各七分

陳皮

當歸

各五分

烏梅

木香

甘草

炙各三分

黑豆

炒四粒

淮棗

二箇

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食前服

大効至聖千金飲子治小兒脾胃虛痢下五色先因嘔吐復作

泄瀉臍腹疴痛脇肋脹滿虛鳴下痢膿血相雜或如豆汁

黃芪

陳皮

粟殼

炙

木香

白芍藥抄

地榆

當歸

白朮

訶子地各五分

枳殼

黃連

甘草炙各三分

黑豆抄四分

烏梅一箇

淮棗一箇

右作一服用水一鍾煎至五分食前服

婦頂丹治下痢赤白裏急後重

乳香

沒藥各五錢

杏仁十四箇去皮尖巴豆粒去油

黃蠟

黃丹飛各一兩

右為末用黃蠟溶化為丸如黍米大每服七丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下不拘時

木香五錢丸治小兒下痢膿血

木香

肉豆蔻五錢黃連

地榆

當歸

白芍藥抄各七錢半

右為細末蒸烏梅肉丸如麻子大每服三十九用棗湯送

下食前服

沒石子九治小兒熱瀉久痢皆可服

黃連二錢半炒

沒石子五枚訶子炮七

木香炮二

肉豆蔻炮七箇

右為末搗爛餒為丸如黍米大每服三十九白湯送下食

前服

二順散治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀

猪苓

澤瀉

茯苓

白朮

甘草炙

官桂半兩

乾薑半兩

杏仁尖炒另入

右為細末每服一錢用新汲水調下不拘時服

益中膏治小兒吐瀉胃虛嘔逆

陳皮一兩

丁香二錢

訶子炮

肉豆蔻煨

甘草半兩

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九食前米瀉化下
人參散治小兒臟寒泄瀉

人參

木香

白朮

茯苓

附子尖

山藥

一錢半

肉豆蔻

一個

甘草

半錢炙

右為末每服一錢用水同薑棗煎量兒拘時服

訶子湯治小兒泄瀉

訶子

炮

人參去蘆

白朮

茯苓

一錢

木香

陳皮去白

肉豆蔻

兩半

甘草

二錢炙

右為末每服二錢用水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服久瀉手足厥冷加附子大小增減服之

○咳嗽通治方

橘蘇半夏湯治小兒咳嗽身熱有痰

橘紅

半夏及姜製

貝母各七

紫蘇

甘草

各三分

加桔梗黃芩各五分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服

瀉白散治小兒肺臟氣實心胃壅悶咳嗽煩喘大便不

升麻

地骨皮

桔梗

瓜蒌仁各五分

半夏

桑皮

杏仁各七

甘草三分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服

潤肺散治小兒咳嗽氣喘有痰

人參

陳皮

杏仁

貝母

麻黃

阿膠

桔梗各七

甘草三分

右作一服用水一鍾生薑三片煎至五分食後服

知母湯治小兒齁喘氣喘痰壅發熱咳嗽

知母

貝母

滑石

麻黃

訶子

甘草各五分

羌活

苦葶蘇各三分

大黃二分

小麥三十粒

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分食遠服一方有薄苛無麻黃

補肺散治小兒肺氣不足咳嗽喘急

阿膠

牛旁子

杏仁各一

馬兜苓七分

甘草五分

糯米四十粒

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

定喘芎蘇散治小兒咳嗽氣喘

龜麻子

去殼膜川芎

紫蘇

各七分半粟殼蜜炙五分

右作一服用水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

百部丸治小兒咳嗽

百部焙

麻黃去節各杏仁四十箇去皮

右為細末煉蜜為丸如芡實大食後白湯化下一丸仲陽方加松子肉五十粒

①撮口

麝香散治小兒撮口胎熱

麝香

丹砂各半

蛇蛻皮炙

右為細末每用一字唾調塗唇上

丹砂丸治小兒驚風撮口

丹砂

麝香

牛黃各半

半夏

丁香

白附子

鐵粉

天麻

南星

各五

右為細末煮粳米飲為丸如麻子大每服五丸用荊芥湯

不拘時下

定命散治小兒撮口吐白沫

川為尖生三箇麝香少許 赤足蜈蚣半條酒炙乾

右為細末每服半字用金銀薄荷湯調服不拘時

○口噤

立聖散治小兒口禁不開不收乳食

乾錫稍七箇膩粉一錢 乾蜘蛛一錢去口足用新竹

右為細末每服一字乳汁調與服時灌之

瓜蒂散治小兒口噤

瓜蒂七枚 全蝎一枚 赤小豆十四粒

右為細末每服一字米飲湯調服以吐為度

五福化毒丹治小兒上焦有熱胎熱胎毒口舌生瘡

玄參一兩 桔梗八分 赤茯苓 人參

馬牙硝各五小 青黛 甘草各一 麝香

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用薄荷湯不拘

時化服

○臍風

錦灰散治小兒七日臍風發腫

錦帛

燒灰存性一錢雄鼠糞七枚

大棗去核

麝香水許

右為末搗棗肉為膏封裹臍上

白龍散治初生小兒臍風

天漿子

一枚 殭蚕直一枚

膩粉少許

右同為末每服一字用薄荷湯調服不拘時

一字金治初生小兒七日之外忽成臍風撮口牙關緊閉

殭蚕

味酸

歲靈仙

去芦

明礬生用

甘草

生用各二錢

細辛一錢

右為末每用半

煎荊芥湯調塗兩牙關內

臍瘡

封臍散治小兒臍瘡濕腫爛

龍帶灰

亂髮灰

白薑灰

紅帛灰

同研

南星

白欬

當歸

赤小豆

五倍子

五味末

血竭

龍骨

赤石脂

煨

海蝶蛸

百草霜

胭脂

六味同研

右各等分同拌勻再研極細每用一字如濕乾搽乾用清

油調塗臍上

白礬散治小兒臍瘡不乾

白礬

枯

龍骨

各等分

右為末搽敷臍中

神効散治小兒風臍水臍腫爛

黃連

麝香

黃柏

各一錢輕粉二分半

白礬

五分

右同為末以葱煎湯先洗淨然後用藥摻臍上日三四次
五福化毒丹類服方見前

○胎驚胎風

至聖保命丹治小兒胎驚胎風內吊腹肚堅硬目睛上視手足
搐掣角弓反張涎痰壅盛一切急慢驚風並皆治之

全蝎十四

僵蚕直者

白附子

天南星炮

硃砂研

麝香研各二錢

防風去芦

天麻錢二

蟬蛻去泥

金箔十片

右為細末以粳米燂飯取中心軟者搜和為丸每一兩作
四十丸每服一九用金銀薄苛湯不拘時化下

全蝎餅治胎驚寧神定志

全蝎十四箇去毒用

薄荷汁浸炙

白僵蚕五錢

茯神

天花粉

苦梗去芦

天麻炮

遠志肉

羌活

甘草各三錢

右為末麪糊為丸如芡實大捏作餅子每服半餅用金銀薄苛湯化下不拘時

奪命丹治急慢驚風胎風風癇客忤物忤目睛斜視痰壅搐掣等證並治

人參去芦

南星姜製

半夏炮

獨活

荊芥穗

遠志肉

川芎

酸棗仁炒

白附子炒

川白芷

桔梗

甘草

石菖蒲各五錢

白茯苓

白朮

天麻炮

全蝎去毒

防風去芦

羌活

茯神

川烏炮去

僵蚕炒

細辛去葉三錢

蟬蛻十四箇去泥

辰砂

雄黃

麝香各一錢

金箔二片

銀箔

三十片五錢研

右同為細末以至生薑汁打麪糊和丸如芡實大以硃砂為衣每服半丸或一丸用金銀薄荷湯化下不拘時

○客忤

麝香湯治小兒客忤卒痛及氣滿腹痛

半夏

黃芪各一兩

乾薑炮

甘草

肉桂各五錢

麝香

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

犀角散治小兒客忤驚啼壯熱

犀角

麥門冬

釣藤

丹砂各二錢半

牛黃半分

麝香少許

右同為細末每服半錢用薄荷湯調服不拘時

雄麝散治小兒客忤物忤

雄黃一錢

麝香一字

乳香半錢

右為末每服半錢用刺鷄冠血無時調服

○多啼

猪苓湯治小兒邪熱面赤多啼小便不利

猪苓

去破

澤瀉

二兩

白朮

半兩

赤茯苓

二兩

一方 甘草五分

右同為末每服一錢用車前子生地黄麥門冬同煎湯

不拘時調服

金箔鎮心丸安神鎮心退熱

山藥

半兩

珠砂

一兩

馬牙硝

半錢

紫河車

黑豆水煮

甘草

人參

茯苓

各五

麝香

片腦

一錢

金箔

十片

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸或一丸用薄荷

湯化下不拘時

烏梅散治腹疼及臍下冷痛狀如盤腸內吊疝氣多啼等疾

烏梅和核

玄胡索

甘草炙各五錢

乳香

沒藥

釣藤各二錢

柴黃一錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

白芍藥湯治小兒胃寒腹痛至夜多啼

白芍藥

一兩半澤瀉七錢

白朮五錢

桂心二錢

當歸

一錢半乾薑三錢

甘草三錢

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分空心服

寧心膏治小兒驚悸不寧心經有熱多啼安神定志

人參

白朮

茯苓

茯神

山藥

羌活

甘草各一兩

硃砂二兩

斤腦一錢

麝香少許

金箔二十片

石為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用薄荷湯無鹽

化下

三鮮散治小兒心經有執面目赤狂躁氣急驚風

人參

防風

天麻

茯神

大黃

麝香

白附子 各二
赤芍藥

黃芩

僵蚕 各三

枳殼 二

金蝎尾 十五箇
去灰毒

粉草 六

右同為細末每服一錢用薄荷湯調服不拘時

○驚悸

金箔鎮心丸治小兒驚悸睡卧不寧心經恍惚皆治之方見前
辰砂膽星膏治小兒痰熱驚熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂 一

牛膽南星 一
琥珀

青礞石末 各一

天竺黃 二

甘草 五

麝香 少許

石為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸用生薑湯不拘

時化服

木通散治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚熱

羌活

山梔子

各二

大黃

瀉

木通

赤茯苓

甘草

各一

右剉碎每服二錢入紫蘇葉些少用水一盞煎至五分不

拘時服

○急驚

人參羌活散治小兒九染驚搐多因感冒蓋失表散致熱極生

風先以解表退熱方見前

木通散治小兒急驚初發宜与此藥通其心氣祛除風邪

木通

石菖蒲

防風

枳殼

全蝎

炒

木香

甘草

天南星

炮各等分

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分生薑三片同煎
可不拘時服

太乙金丹治小兒急慢驚風胎驚天吊等證

全蝎四十箇

防風

白附子炮

僵蚕炒

天麻

硃砂

牛膽南星

天竺黃各一

蟬蛻五糸

麝香二糸

牛黃一糸

天漿子一箇三十

乾蟾一箇灸

赤脚蜈蚣一箇

去足一絲當脊上開一絲入麝香於

右為細末煉蜜為丸芡實大用金箔為衣每服半丸用金

銀薄苛湯不拘時化服

全蝎散治小兒急驚風

全蝎

僵蚕炒

川芎

黃芩

南星炮

天麻

甘草

赤芍藥

桂皮

麻黃各等分

右劉碎每服二錢用水一盞生姜三片煎至五分不拘時
候服

○慢驚

觀音金竭散治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢
驚等證

全蝎二箇

天麻

防風

羌活

川白芷

甘草

扁豆

黃芪

砂仁

赤茯苓

右同為末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參

白朮

木香

白茯苓

白附子

天麻

全蝎

僵蚕

右劉碎每服一錢水一盞生姜三片棗一枚煎至五分

拘時服

○急慢驚風

抱龍丸治小兒痰熱咳喘驚風

方見嗽驚熱類

太乙保生丹治小兒急慢驚風痰熱喘嗽

全蝎

白附子

僵蚕

牛膽南星

蟬蛻

琥珀

防風

硃砂

麝香

五分

右為細末粟米糊為丸如芡實大每服一丸用薄荷湯不

拘時磨化服

保安散治小兒急慢驚風及諸癰痰涎壅盛

川烏尖

生附子

星

花蛇肉

各一錢

輕粉

麝香

片腦

蝎梢

各一錢半

赤脚蜈蚣 一條炙

右為細末每服半錢用薄荷生薑湯不拘時調服

○慢脾

大醒脾散治慢脾風內虛昏悶不省

人參

茯苓

木香炮

全蝎焙

南星泡

白朮

陳皮

石蓮肉

甘草炙

丁香

砂仁

白附子炮各等分

陳米炒一握

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分

不拘時服量兒大小加減與服

寶脾散治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參

白茯苓

白朮

砂仁

麥芽

神麴

陳皮

石蓮肉

乾山藥

良姜

炮炒

青皮

冬瓜仁

冬子

丁香

木香

薏苡仁

炒

扁豆

姜炒

香附子

炒

甘草

炙

陳米

炒

肉豆蔻

二枚

右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

固真湯治小兒吐瀉後脾胃虛弱遂傳慢風不省人事

人參

白茯苓

白朮

附子

炮製去皮

乾山藥

黃芪

蜜炙

肉桂

甘草

炙

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎至五分

不拘時服

○驚風

搗鼻開閉藥搗鼻而嚏者可醫不嚏者難治

皂角

炙

北細辛

南星

生用

半夏

生用各

加入麝香

一分

右同為極細末每用少許以竹管盛藥吹入鼻中牙關緊
用烏梅煎濃汁調和藥末擦入兩牙關內

天麻防風丸治一切驚風壯熱痰涎壅盛

天麻

防風

人參

牛黃

硃砂

雄黃

麝香

僵蚕

全蝎

去毒炒
各半兩

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九用薄荷湯不拘
時化服

防風湯治驚風熱不退時復手足搐心神不寧

防風

川芎

白芷

黃芩

細辛

薄荷

茯苓

甘草

各等分

右同為細末每服一未用白湯不拘時調服

○口喎并失音

硃砂丸治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂五朱

全蝎炒

天麻

白附子炮

僵蚕絲去

乾姜炮

牛黃各五分

麝香一分

右為末粳米糊丸如黍米大每服三十九用薄荷湯不拘時化服

全蝎散治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎炒

川芎

黃芩

僵蚕絲去

赤芍藥

甘草

硃砂

南星湯泡去

天麻各三朱

右為細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲治小兒風痰壅滯風傷於氣不能言語

枳殼去穢

人參去芦

天麻

僵蚕絲去

羌活

甘草炙各

右劉碎每服二錢用水一盞生姜三片煎五分不拘時服
木通湯治小兒血滯於心心竅不通語言不出

木通

石菖蒲

多用

防風

枳殼

全蠍

焙

僵蚕

炒

甘草

木香

南星

炮各等分

右劉碎每服二錢用水一盞猪心三片生姜一片紫蘇五
葉煎至五分不拘時服

○拘攣

續命湯治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃

人參

黃參

川芎

芍藥

甘草

炙

防風

杏仁

去皮

官桂

去皮

防己

附子

炮裂去灰

右劉碎每服二口水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

建風散治小兒感冒發熱手足拘攣宜服此藥

人參

茯苓

防風

川芎

柴胡

羌活

枳殼

桔梗

甘草

各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生姜三片煎五分不拘時服

薏苡仁丸治小兒手拳不能展用

薏苡仁

湯洗去皮

當歸

防風

牡丹皮

羌活

酸棗仁

去皮各一及

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九用荊芥湯不拘

時化下

海桐皮散治小兒腳攣不能伸率

海桐皮

當歸

牡丹皮

熟地黃

牛膝

各一及

山茱萸

補骨脂

各五升

右剉碎每服二錢水一盞葱白二寸煎至五分不拘時服

○驚積

香砂保安丸治小兒乳食停滯膏膈不寬肚腹膨脹脾疳驚積

積聚並皆治之

香附子 二月

砂仁

白朮

神麴

麥芽 各一

糖求 半

益智

陳皮 各七

甘草 三

木香

檳榔

火均子 去殼各

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九米湯空心化下

三棱散治小兒飲食停滯肚腹脹滿驚積食積發熱等證

三棱 曲

香附子 各一

青皮

陳皮

半夏

枳殼

益智仁

神麴 炒

麥芽 焙

蓬朮 醋黃

大黃 半生

紫蘇

茯苓 各一

甘草 炙

右剉碎每服二錢用水一盞生姜三片煎至五分不持時服量兒大小加減與服

○解頤

補腎地黄丸治小兒稟賦不足腎氣虛弱骨髓不充頤縫不合體瘦力弱

熟地黄

酒浸

川牛膝

酒浸

龜茸

蜜塗

山茱萸

酒浸蒸透去核取皮

乾山藥

各五

牡丹皮

洗淨

白茯苓

各三

澤瀉

二升

右為末煉蜜為丸如麻子大每服十五丸或二十丸空心用鹽湯或溫酒任下

調元散治小兒稟受元氣不足頤頤間解

乾山藥

五升

人參

去芦

白朮

白芍藥

白茯苓

茯神

當歸

熟地黄

黃芪

各二

甘草

炙

川芎

各二

右剉碎每服二錢用水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

栢仁散治小兒解顛不合

防風半一栢子仁一白芨二

右為細末每用一字用乳汁調塗顛上

桂心散治小兒顛開不合

桂心細辛各五乾姜半

右為細末每用一字或半錢用乳汁調敷顛上

參芪當歸散治小兒臟腑虛弱氣血不榮以致顛陷

人參黃芪當歸白朮

訶子煨甘草炙

右剉碎每服二錢用水一盞煎至五分不拘時服

○寒熱

人參前胡散治小兒感冒寒熱往來

人參

前胡

柴胡各一

桔梗

半夏

甘草

地骨皮各五

右剉碎每服二錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

秦艽湯治小兒陰陽相勝寒熱往來

秦艽

蟹甲

各一乃竹茹二升

大黃

麻黃

去節

甘草

柴胡各五

檳榔三升

右剉碎每服二錢水一盞煎至五分不拘時服

二姜丸治小兒寒熱與霍相似

乾姜

良姜

各等分

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三五丸用白湯空心

化下

○譌語

寧心膏身見多啼類

寧眠膏治小兒驚熱心神恍惚譫語睡卧不穩

甜消

人參

硃砂各一

茯苓

山藥

甘草炙

寒水石煨各五

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一九薄苜湯下不拘時

小柴胡湯治小兒傷寒胃風身熱胸滿脇脹

柴胡

黃芩

半夏

人參

甘草各一

右剉碎每服三錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

大柴胡湯治小兒風熱腹脹及裏證未解譫言妄語疎利大便

柴胡

去芎

黃芩

去芎

赤芍藥

各一

大黃

半夏

各七

枳實

七

甘草

一兩

右剉碎每服三錢用水一盞生姜三片紅棗一枚煎至五

分不拘時服

○口瘡

一捻散治小兒口瘡

青黛

黃柏

訶子

密陀僧各等分

加入枯白礬少許

蒲黃少許

右每用少許貼口瘡處

五福化毒丹 方見口噤類

明砂散治小兒口舌生瘡咽喉不利重舌馬牙

明砂

蒲黃

淨硝

孩兒茶

薄荷

甘草各二

青黛一

片腦少許

右為末每用少許付點口中瘡處

○齒斷

鎮驚丸治小兒驚風咬牙心神不安

辰砂

鉄粉

京墨

片腦

麝香

各一字

右為末麪糊丸如梧桐子大每服三四丸用荊芥湯不拘時服

蟬花散治小兒驚風咬牙

蟬花

和鼓去土

僵蚕

去絲

雄黃

玄胡索

各等分

右為細末每服半錢用蟬殼湯不拘時調服

五癩通治方

散風丹治小兒風癩先用此藥

牛膽南星

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荆芥穗

細辛

各一字

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷茶湯

不拘時送下

保嬰丸治小兒諸風癰久後亦驗

五靈脂

半斤 川烏 生用 去灰 二斤半

右為末猪心血為丸如梧桐子大每服一九用生薑湯化

下不拘時服

獨活湯治小兒風癰解表通裏

獨活

麻黃 去節

川芎 各一

大黃

甘草

炒 各半

右剉碎每服二升用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時

溫服

細辛大黃湯治小兒風癰內熱

天麻

防風

各半

細辛

大黃

焙

川芎

各半

甘草

炙 各半

右剉碎每服二升入犀角少許用水一鍾煎至四分不拘時服

牛黃丸治小兒風癇迷悶抽搐涎潮

半膽南星

全蝎

焙去毒

蟬殼

各二升半

防風

牛黃

白附子

生

直僵蚕

炒去絲

天麻

麝香

半升

右為末以煮棗去皮核取肉和水良半升研極細次入藥末和丸如棗豆大每服三五丸用荊芥生薑煎湯送下不拘時服

拘時服

○驚風

此金膏治小兒驚風

人參

琥珀

白茯苓

遠志肉

姜制

硃砂

天麻

川芎

石菖蒲

研末

南星

黃升二水煨香

一字

青黛

一糸

右末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五丸煎金良藥奇

湯磨化不拘時服

鎖驚丸治小兒一切驚癇

茯神去木

鐵粉

遠志

去心姜製

紫石英

燒研

人參云薑

琥珀

滑石

蛇黃

微酒拌

南星

炮各二

龍齒

熊膽

各半

輕粉

三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三五丸

煎金良湯磨化不拘時服

虎睛九治小兒驚癇邪氣入心

虎睛

細研

遠志

姜製焙

犀角

鎔

大黃

濕片

石菖蒲

麥門冬

去心各

右為細末粟米粉打糊為丸如梧桐子大每服五七丸竹

葉前湯磨化或金良煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸治小兒驚風心熱

遠志去心姜製

雄黃

鐵粉

琥珀各二

硃砂一朱

金良稍四片麝香少許

右為細末煮棗取肉為丸如梧桐子大每服三五丸煎去

心麥門冬湯化下不拘時服

清神散治小兒驚癇

犀角

白藜皮

石菖蒲

遠志

去心姜製

半夏

二朱半茯神五朱

大黃焙

人參

甘草

炙各一

右為末每服半朱煎去心麥門冬湯化下不拘時服

妙聖丹治小兒食積通利

雄黃

喝稍

硃砂

代赭石

煅醋淬

輕粉

麝香

各二

巴豆

三箇去

杏仁

去尖微

右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯

磨化不拘時服

天麻丸治小兒食瀾有痰

南星

炮二

白附子

炮

天麻

牙硝

川靈脂

全蝎

焙各

輕粉

半

巴豆霜

去油二

右為末稀麵糊為丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或

薑湯送下亦可不拘時服

牛黃清心丸治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒

牛黃

一分

麝香

研

龍腦

另研

鈴羊角末

一鎊

當歸

去蘆

防風

去蘆

黃芩

麥門冬

去心

白芍藥

白朮

各一

柴胡

去苗

木仁

去皮尖入

桔梗

白茯苓

去皮

芎藭

各一

阿膠

蛤粉炒

肉桂去金

大豆卷研炒各一

蒲黃炒

人參去蘆

神曲炒各二

雄黃研飛

白欬

乾姜各七

金箔為一千二百片內四百片

犀角末

乾山藥十刀 大棗一百枚去核

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入煎

藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十九丸用金箔為衣每服

一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇即酌度多少以竹華

煎湯溫化服

蛇黃丸治小兒諸癇

蛇黃

一箇研碎

鬱金

雄黃各二

青礬石

硃砂各一

鐵粉研三分

右為末鵝粳米飯為丸如梧桐子大每服三五丸人參煎

湯磨化不拘時服

疳疔九治小兒諸癰瘰癧

皂角五尺者三錢去皮連碎水三升白礬一兩研

端精炒直僵蚕炒雄黃另研硃砂另研

白附子各半麝香另研烏蛇酒浸取肉焙

南星溫熱藥一兩赤蜈蚣一條酒浸

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為丸如梧桐子大

每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

當歸大黃湯治小兒諸癰壯熱利下心中惡血

大黃溫熱藥甘草炙當歸赤芍藥各三

半夏製川芎各二

右為末每服一錢或二錢用水八分鍾煎至四分不拘時服

代諸石散治小兒陰陽疳通用

代諸石代諸石散

右每服半錢以金銀器煎湯或和金箔銀箔在內同調不拘時服食父小兒脚脛上自有赤斑即邪氣發出其病隨瘥若無赤斑則難治也

地龍散治小兒諸癇發歇無時

乾地龍

半兩

虎睛

一對

人參

二兩

金銀箔

三十片

天竺黃

硃砂

代赭石

煅醋

鐵粉

各二兩

雄黃

半兩

輕粉

半兩

右為末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

定癇丸治小兒五癇

赤脚蜈蚣

一條去頭足酒浸炙

蝎梢

去毒

烏蛇肉

屑炙

白附子

生

大南星

末

圓白半夏

末用姜汁和一

熊膽

白礬

新九上煨熟各一兩二分半

石為末稀麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服二三九

用藥新煎湯磨化不拘時服

○胎熱

胎乳方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通乳食不能進

澤瀉

一兩二分

猪苓

赤茯苓

天花粉各半

生地黄

一兩

箇陳

甘草

各五

右剉碎每服一兩用水一鍾煎至八分食遠令乳母捏去宿乳却服此藥

生地黄湯治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之證皆因母受熱而傳於胎也凡此證宜服略與小兒服之

生熟地黄

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉

各半

五疳所因心火熾盛
 兒瘦弱日夜熱
 滯受上賊者心火之病
 也主於心治則火清
 肝之病身熱瘦弱白
 腫通睛者肝之病也
 主乎肝治則木可清
 脾之病身瘦腹大
 血定皮好食消
 地而脾為脾之病
 其脾之土自旺
 肺之病身瘦腹大
 痰嗽氣喘口鼻生
 瘡肺之病也主於肺
 治則金旺痰止
 腎之病身瘦極瘦
 如生瘡疥疳之病

右劉碎每服五錢水一盞煎至五分食後服

○五疳

五疳保童丸治小兒五種疳疾

青黛

五倍子

生用 磨膏 另研

夜明砂

布裹洗淘 去砂土

黃連

去鹽

龍膽草

生用 干蟾 磨炙

苦練根皮

麝香

另研

蕪荑仁

蟬殼

去土 各 手分

右為細末用粟米粉打糊為丸如麻子大一歲小兒服一

十九用米飲湯送下不拘時服量兒大小加減

胡黃連麝香丸治小兒疳氣羸瘦生寸白虫

胡黃連

白蕪荑

黃連

木香

各半

夜明砂

另研

麝香

右為細末用粟米粉打糊為丸如麻子大一歲小兒服五

七丸至十九三五歲已上者可服三十五丸米飲湯送下

上焦血
黑眼爛血
法面脫
更不獲生
一且要治
之到運自
調則
活方

不拘時服

大蘇香丸治小兒諸疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

蘆薈

白無雙仁

木香

青橘皮

雷丸

者發開白者佳赤

鵝虱

半兩

麝香

二另研

者為細末搗粟米飯為丸如菉豆大每服一二十九米飲

湯下不拘時服

龍粉散治小兒疳渴

草龍膽

定粉

烏梅肉

倍

黃連

各半

者為細末煉蜜為丸如麻子大每服二三十九用米飲湯

下不拘時服

消氣丸治小兒疳疾腹脹喘急氣絕

木香

二錢

蘿蔔子

半兩

同炒

黃色去已

不用

右為細末麵糊為丸如菜豆大三歲兒三十九用米飲湯下量兒大小加減不拘時服

分氣丸治小兒疳證

木香半錢

黑牽牛半兩

右為細末麵糊為丸如菜豆大三歲兒三十九用米飲湯

送下不拘時服

子丑散治小兒疳證

鼠糞

黑牽牛各等分

右為細末三歲兒每服一錢用橘皮湯調不拘時服量兒

大小加減

黃土丸治小兒疳證

黃土

陳皮略一

木香半兩

巴豆三十粒

右為細末麵糊為丸如菜豆大三歲兒三十九煎黑豆湯

下不拘時服量大小加減

又方治契土

黃連

黃土各等分

右為細末麵糊為丸如菜豆大三歲兒二十九煎黑豆湯下米飲湯亦可不拘時服

○項軟

天柱丸治小兒風熱氣血不和頸軟頭不得正或前或後或左或右

蛇含石

用大塊泥七次

川爵金末

少許

右並碾細末入乳鉢內再研極細入麝香少許和勻用煮大米飯搗爛為丸如圓眼大每服一丸用荊芥湯化服又入生薑汁一二滴或金銀薄荷湯亦可不拘時服

五加皮散治小兒頸軟

五加皮

不拘多少

右為末酒調塗傳頸骨上

捷骨散治小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒謂之

○五軟

白僵蚕

不拘多少

右為細末三歲每服半錢薄荷酒調下

生筋散治小兒證如前

木鱉子

六箇去殼

單麻子

六十箇去殼

右為細末先抱起頭顱摩頸上令熱先用生山藥搗汁和藥二味調貼之

吐血

鵬砂散治小兒喉閉生瘡風痰熱毒鼻衄出血吐血

山藥

足兩

腦子

七錢

甘草

二兩

牙硝

四兩

鵬砂二兩生研 麝香四兩生研

右為末每服三分或五分量兒大小加減用茶清湯食後調服

三黃丸治小兒積熱吐血咽膈不利

黃連去頭 黃芩去腐 大黃煨各

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十丸熟水下如臟腑壅實加服丸數小兒積熱亦宜服之量大小加減

茯苓補心湯治小兒心虛為邪氣所傷有熱吐血

陳皮去白 桔梗去毒 甘草炙 枳殼去核

木香各五 紫蘇葉 茯苓去皮 半夏湯洗

乾葛 前胡去蘆 人參去蘆各 當歸去蘆

川芎 芍藥 熟地黃各五

右作一服水一盞半生薑三片紅棗一枚煎至六分不拘

時服

天門冬九治小兒吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬一兩

甘草

阿膠

白茯苓

貝母

杏仁

炒另研各半兩

右為細末入杏仁和勻煉蜜丸如梧桐子大每服一丸噙化日夜可噙

是齊白水散治小兒積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃吐血者最宜服之

白朮二兩

人參去蘆

白茯苓去皮

黃耆

蜜炙各一兩

柴胡二兩

山藥

百合

去心各七兩

甘草

半兩炙

煎胡去蘆二兩

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至五分

食後服

藕汁飲治小兒吐血嘔血不止

生藕汁

生地黄汁

大蘗汁各三

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小匙不拘時服

四生丸治小兒吐血衄血腸乘於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黄各等分

右爛研丸如圓服大每服一九水一盞煎至四分不拘時服

千金龍膽湯治小兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱

吐衄者若已曾進乳哺中實食不消壯熱及變蒸不解中

客忤鬼氣并諸驚癇悉主之

龍膽

鈎藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓一方用茯苓

甘草炙各二

蟻蛭二枚

大黃一兩五分

右剉碎每服三錢水一盞生姜三片煎至五分不拘時服

便血

槐角丸治小兒五種腸風下血脫肛

槐角炒

地榆

黃芩

當歸

去芦酒浸

防風去土

枳殼炒各半兩

右為細末酒糊為丸如菜豆大每服二十九米飲湯送下

食乳前服

槐花散治小兒腸風臟毒下血

槐花炒

柏葉焙

荊芥穗

枳殼

各等分

右為細末每服一錢空心米飲湯調服

槐角散治小兒腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼各二兩

槐角二兩

甘草

烏梅

各半

右剉碎每服五錢水一盞煎至五分不拘時服

烏梅丸治小兒大便下血不止

烏梅 三兩 燒存性

右為末用醋打米粉糊為丸如菉豆大每服三十丸空心米湯送下

黃連散治小兒腸風下血疼痛不止

黃連 雞冠花 貫衆 大黃

烏梅 各一 甘草 炙半

右為細末每服一錢用溫米飲調不拘時服

黃連貫衆散治下血

黃連 貫衆 大黃 雞冠花

烏梅 各一 甘草 炙二 枳殼 荆芥 各五

右為細末每服一錢用溫米飲湯調食前服

○秘結

牛黃散治小兒上焦熱臟腑秘結

大黃一兩 白牽牛頭末 五錢

右為細末每服一錢有厥冷用溫酒調下無厥冷而手足煩者蜜湯調下不拘時服

郁李仁丸治小兒極褊大小便不通并驚熱痰實

郁李仁一兩去皮川大黃一兩去麁皮實者連碎

滑石十兩細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服二三十丸更量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前服

犀角丸治小兒風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱臟腑蘊

毒疎導極穩

生犀角一錢人參半兩黃連枳實各一兩

大黃二兩酒浸切片用巴豆內一粒貼在大黃上

右各味同為細末煉蜜為丸如麻子大每服一二十丸
即熱水下未動再服

沒藥散治小兒風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼

桔梗

木香

甘草

炙

右剉碎每服三錢生薑二片水一盞煎至五分不拘時服

○諸淋

遺赤散治小兒心虛蘊熱小便赤澀或成淋痛

生乾地黃

木通

甘草

右剉碎每服三錢水一盞竹葉十片煎至六分不拘時服

玉淋散治小兒腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿

如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

赤茯苓

六錢

赤芍藥

當歸

去

甘草

生用各二

右劉碎每服三錢水一盞煎至六分空心服

八正散治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀癰閉不通及熱淋血淋並皆治之

車前子

瞿麥

篇蓄

滑石

甘草

山梔子仁

木通

大黃

麩裏煨

右劉碎每服五錢水一盞燈心七根煎至七分食前服

清心蓮子飲治小兒上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澀或欲成淋並宜服之

黃芩

半兩

黃耆

蜜炙

白茯苓

石蓮肉

去心

人參

各半

車前子

甘草

炙

麥門冬

去心

地骨皮

各半

右劉碎每服五錢水一盞煎至六分食前服如發熱如柴

胡薄荷

五苓散治小兒伏熱小便赤痛如淋

澤瀉二兩半 猪苓去皮 赤茯苓去皮 白朮酥炙

肉桂去粗皮

右為細末每服一錢用燈心湯調不拘時服

○蟲動

靈璧散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂末 白礬枯半

石同為末每服二錢水一盞煎至五分不拘時服當吐虫出愈

史均子丸治小兒臟腑虛滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳食若常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴去麁皮 史均子去殼一兩 甘草半兩

陳皮去白二 訶子半生半煨

青黛

半兩 入此末如藥不調不用

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下或乳汁化下亦可不拘時服

○癰癤瘡

漏蘆湯治小兒癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫

漏蘆

黃芩

白芨

麻黃

去節各

大黃

三升

白薇

粉草炙

枳殼

去白

芍藥

升麻

各二

右剉碎每服四錢水一盞煎至六分空心服

忍冬散治小兒湯疾既愈須預防發癰疽之患

忍冬草

一兩 甘草節

大黃

生

右為末每服三錢水一盞煎至七分調乳香末些少不拘

時服

○瘡疥

加味羌活散治小兒四氣外搏肌膚發為癰瘡增突發熱身痒

羌活

前胡各一兩

人參

桔梗

茯苓

甘草炙

川芎

枳殼麸炒

天麻

略半

蟬蛻

去青

薄荷各二

右剉碎每服三錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服

當歸飲子治小兒心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或

腫或痒或膿水浸淫

當歸

去芦

赤芍藥

川芎

生地黄

蒺藜

炒去刺

荊芥穗

防風

去芦各一兩

何首烏

黃耆

去芦

甘草

炙略

右剉碎每服四錢水一盞生薑三片煎至六分不拘時服

丹毒

麻黃湯治小兒惡毒丹毒及風疹

麻黃

升麻

葛根各一兩

射干

雞舌香

甘草炙各兩

石膏六兩

右剉碎每服四錢用水一鍾煎至六分不拘時服

漏湯方治小兒數腫丹

當歸

大黃生

甘草生

芎藭

白芷

濁沽

黃芩

赤芍藥

升麻

沉香

木香

木蘭皮各

芒硝三兩
另入

右剉碎以水一斛二升煮取四升去滓內芒硝在內試其

冷熱以絹帛搗在患處

敗毒散治小兒瘡毒初發遊走遍体燥悶腹脹啼哭

桔梗

天花粉

乾葛

川升麻

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

甘草各等分

右剉碎每服四錢水一盞生薑二片煎至六分不拘時服

○癰疹

地龍散治小兒風熱癰疹狀如傷寒耳尖及手足冷

地龍洗去土半兩焙乾

穿山甲半兩以皂角灰炒令黃

硃砂研細錢

右前二味為細末後入硃砂一釐再研和勻每服一錢用

紫草煎湯調不拘時服量兒大小加減

消毒飲治小兒頭疼發熱癰疹如粟米狀

牛旁子三兩荊芥半兩甘草炙一兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分不拘時服

清涼飲子治小兒癰疹大便結燥

大黃溫經

常歸

赤芍藥

甘草炙各

右剉碎每服三錢水一盞薄苛三五葉煎至七分食遠服

○湯火

治湯火所傷方

用黃蜀葵花浸油內以油敷患處或收黃蜀葵花晒乾碾末香油調敷亦可

又方

右用定粉礬極細末臘月猪脂調敷患處

又方

右用單麻子肉碾爛入蛤粉等分如乾再入香油炒少調搽患處

○鯁骨

治魚鱉骨鯁用貫衆為末井花水調令濃大呷一口慢上嚥下

又方

以野苧根淨洗搗爛每用如圓眼大如被雞骨所鯁以雞黃化下魚骨則以魚汁化下

又方

以南鵬砂不拘多少噙化其骨脫然而下

又方

以懶瓜於咽喉下邊爬患處効

獸骨鯁

以象牙梳或牙笏或器血磨水嚥下効

○中毒

食牛羊馬肉毒

又以蘆根煮汁頻服有効

治蠱毒

用生甘草為末白礬末各一兩不拘時用冷水調下一錢
即吐喉痺及嶺南啞瘡

○吐逆噦逆

香薷湯治小兒陰陽不順清濁相干中暑霍亂吐逆體熱煩燥
昏冒多渴

香薷

厚朴去皮

黃連

用姜汁拌炒
作紫色各一兩

右剉碎每服五錢用水一鍾酒少許煎至五分去祖水中
頻令乳母同服一方入白扁豆炒等分

王氏半夏散治中暑伏熱生痰嘔吐

半夏

赤茯苓

去皮

甘草

陳粳米

五十粒

右剉碎作一服水一鍾倍加生姜煎至五分不拘時服
湯氏玉露散治小兒中暑昏迷煩渴不止心燥體熱頭疼

石膏

煨用

寒水石

煨

甘草

五錢

右為末每服一錢用白湯調入生姜汁七少不拘時服暑熱涼水調服亦可

竹茹湯治小兒胃熱嘔吐

青竹茹如彈大半夏湯洗七次一錢瘦米九粒乾葛一錢

右剉碎作一服水一鍾生薑三片煎至五分量兒大小加

減與服亦治傷寒後嘔吐

附子理中湯治小兒寒證嘔吐不止防傳慢驚

人參去芦白朮去半乾姜炮附子炮去皮

甘草炙六分

右剉碎作一服水一鍾煎至五分不拘時服一方加木香

不換金正氣散治小兒感寒熱嘔吐

藿香去土七分厚朴去皮姜炙甘草五分半夏湯洗七次

蒼朮米泔浸陳皮各一錢

右剉碎作一服水一鍾生薑三片棗二枚煎至五分食後溫服

益胃散快膈益脾止嘔進食

木香

丁香

藿香

陳皮

縮石

白豆蔻

各半甘草一分

右為細末每服一錢用薑棗煎湯調服一方加茯苓

釀乳法治小兒冷氣入胃嘔吐及慢驚睡多驚啼及頭面黃脉

細者難治

人參

木香

藿香

沉香

神麴

麥蘖

陳皮

丁香減半

右剉碎每服五錢用水一鍾生薑五片紫蘇十葉紅棗三枚砂瓶內煮至半鍾令乳母服後檢去乳汁即仰臥霎時令藥入乳絡令兒喫數口不過飽乃良法也嘔定令兒服

木方八仙散吉州醒脾散

○吐瀉泄瀉

五苓散治小兒霍亂吐瀉煩渴飲水小便不利

澤瀉二兩

猪苓去皮

白茯苓

白朮各一兩半

官桂去皮一兩

右為末每服一錢溫湯調不拘時服如渴燥耕水調下

調中丸又名理中丸治小兒脾胃虛冷

人參去

白朮

甘草炙各半兩

乾薑四兩炮

右為細末煉蜜丸如菰豆大每服二十九食前溫水送下

或作芡實大米湯化亦可

香橘餅子治傷食聚瀉

木香炮

青皮去白

陳皮去白各半兩厚朴制七

神麴炒

麥蘖炒各半兩

右為末煉蜜丸作餅用淡生薑湯化不拘時服

調中散治小兒傷食泄瀉

人參去芦

白茯苓

白朮

乾薑炮

藿香葉

香附子炒去毛

甘草炙各

縮砂仁二錢

木香炮

丁香各半

右為細末每服一錢用姜棗煎湯調服不拘時服量兒大

小如減或作煎劑亦可

保安丸治小兒瀉瀉傷食瀉

香附子炒

砂仁各一

白姜

青皮

陳皮

三稜炮

蓬朮炮

甘葦炙各

右為細末麥蘖碾末打糊為丸如菉豆大每服二三十丸

淡姜湯下食前服

沈香煎丸治冷積礙積疳積食積乳積中脘不和痞氣鬱結或

總刺喉癰肚腹疼痛傷食泄瀉等證並皆治之

乳香

沉香

杏仁

木香

丁香

百草霜

二錢

肉豆蔻

巴豆

七粒

右為細末煨黃蘗入酒些少和為丸如菴豆大每服三五丸姜湯送下兼治肚痛不止以通為度

○滯痢

胃風湯治小兒風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉腹痛虛滿

腸鳴痞痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血等證

方見痢疾頭類

黃連阿膠丸治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口躁

煩渴小便不利

黃連

三兩

阿膠

一兩

茯苓

二兩

右各為末水熬阿膠膏搜和丸如菴豆大每服二十九

空心溫米飲送下

倉廩湯治小兒下痢赤白或先因寒邪中臟腑致發熱者

紫胡去芦 前胡去芦 人參去芦 茯苓去皮

羌活去芦 獨活去芦 枳殼去穢炒 桔梗去芦

川芎 甘草炙 陳倉來各等分

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗二枚煎至五分

不拘時服

真人養臟湯治小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急

後重臍腹疝痛脫肛墜下熱毒便血並皆治之

罌粟殼去穢一兩三錢 人參去芦 當歸各五錢酒浸

肉桂去皮 訶子去核 木香不見火 肉豆蔻二錢半

白朮去三 白芍藥八錢 甘草生九

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服如臟寒者加

附子煎服

駐車丸治小兒一切下痢無問冷熱

阿膠

兩半 碎成珠為末 一

黃連

三

當歸

兩半

乾薑

兩

右為末以阿膠膏為丸如菽豆大每服二三十丸食前用

米飲送下

道氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥

一兩

當歸

五

大黃

黃芩

各二

黃連

木香

檳榔

各一

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服

神効參香散治小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血

或如豆汁或如魚腦或下瘀血及紫黑血或赤白相雜裏

急後重日夜頻併無問新舊並皆治之

白扁豆

人參去芦

木香各一兩

白朮去皮

肉豆蔻

煨各二兩

陳皮去白

粟殼

去筋膜各六兩

右為細末每服一二錢不拘時用米飲湯調服

聖効散治久痢

赤石脂

煨

白龍骨

阿膠

各一兩

呵子肉

去核

木香

黃連

乾姜

甘草

炙

右為細末每服一二錢煎粟米飲湯調空心服

厚腸丸治血痢脫肛

川練子

去核

黃連

各一兩

木香

阿膠

炙

當歸

吳茱萸

同黃連一湯

右為細末粟米飯為丸如黍米大每服二三十丸食前米

湯送下

感應丸治小兒停積宿食冷物不能消化有傷脾胃或泄瀉臭

如抱壤維子或下痢膿血服此通利

百草霜

用村家鍋底上

杏仁

云皮尖要肥者

巴豆

去皮心膜或由研

肉豆蔻

去皮十箇川乾薑

南木香

去皮一兩

丁香

七

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味并為細末與前三

味同拌研令細用蠟置先將蠟三兩溶化作汁以重綿濾

去滓更以好酒半升於銀石器內溶蠟讓數沸傾出候酒

令其蠟自浮於上取蠟料用丸春夏脩合用清油半兩秋

冬用清油七錢半於銚內熬令香熟次下酒煮蠟工兩同

化作汁就鍋內更熬拌和前項藥末成劑分作小銚子以

油車紙裹之旋丸如菽豆大每服三五丸空心薑湯送下

消食丸又名消乳丸治積滯化乳食

砂仁

橘皮

京三棱

蓬莪朮

炒

神麴炒

麥蘖炒

甘草半兩

香附子炒

右為細末湯浸蒸餅為丸如麻子大每服三十丸食遠白湯送下量兒大小加減

水香丸治乳積食積氣積

木香

蓬朮

砂仁

青皮去白

珠砂細研

代赭石煅研

大丁香一錢

巴豆肉油

右為細末和勻飛白麵糊丸如麻子大風乾每服三五丸至十丸乳傷乳汁下食傷米飲下不拘時

七聖丸治小兒宿食不消肚腹飽悶

京三棱

蓬朮

川練煨取

青皮去穢

陳皮去白

杏仁去皮

芫花

先用醋浸一宿炒黃乾

色皮入醋炒川練一兩五分

右前件為細末另入杏仁細研一罇醋糊丸如黍米大每服三五十九臨睡熱水送下使日間所食之物一夜而消化求無痺疾之證一方用巴豆十粒同杏仁研有癖積者可用當服只用杏仁七聖丸也

異香散治小兒食積過飽飽後噫酸調理脾胃

石蓮肉一兩 蓬義木 益智仁 京三棱

甘草各三 青皮去穢 陳皮各二 厚朴姜汁炒

右剉碎每服五錢水一鍾生薑三片棗一枚鹽少許煎至五分不拘時服作未淡鹽湯調服亦可

縮砂香附湯治小兒噎宿腐氣心腹膨脹或時冷痛

香附子五錢去毛 烏藥二錢 縮砂去皮

粉草一兩

右為細末每服一錢紫蘇三葉鹽少許煎沸湯調下不拘

時服如大便秘橘皮湯調服又名寬氣散

穀神丸治小兒宿食留飲積聚中脘噎酸氣悶

人參

縮砂

香附子去毛

三棱煨

義術煨

青皮

陳皮

神曲炒

麥蘖炒

枳殼去穢

各等分

右為末煮粳米搗爛為丸如黍米大每服三五十丸空心

米湯下鹽湯服亦可

七香丸消食快膈和胃氣止嘔痛

木香

丁香

檀香

甘松

丁皮各一

陳皮去白

縮砂仁

去殼

三棱醋煮

蓬朮醋煮

各一

白豆蔻

二

益智仁

三

香附子

去毛

石為細末水糊丸如珠二大每服三五十丸食遠淡薑湯

送下米湯亦可

保和丸治小兒脾胃虛弱飲食不能消化日久瀉痢

糖棗四兩

陳皮

茯苓

半夏麴各五

蘿蔔子五分白朮

史均子肉

神麴

麥蘖酪一

木香二兩二分砂仁四兩

黃連五分

右為細末水發為丸如蘿蔔子大每服一錢不拘時米飲湯送下

揭九子治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不調心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食噉乳癖痰氣痞結積聚腸胃或秘或痢頭面浮腫不思乳食及療五種疳氣八種痢疾肌肉消瘦氣羸腹大神色昏憤清意不樂常服散冷熱調和臟腑去疳積止瀉痢進飲食生肌肉悅顏色功効非常不能盡述

蘿蔔子

二兩陳皮去白

青皮去白

京三棱炮

蓬朮

一兩

胡椒

半兩

木香

二兩

黑牽牛

一兩五分 生用一半

右為細末水煮麪糊為丸如麻子大每服二三十丸空心用蘿蔔煎湯或姜湯送下量兒大小加減服之

長生丸治小兒清上實下補脾治痰及治傷食乳不消化大便酸臭

木香

半兩

檳榔

三兩

全蝎

二十箇 去毒

枳殼

一兩 去穢

丁香

肉豆蔻

縮砂

半夏

姜湯泡七

右除肉豆蔻外七味為細末次入肉豆蔻再研極細末用米飲和丸麻子大每服三五丸空心乳汁或米湯送下

○丁奚疳露

十金丹治小兒手足極細項小骨高尻削體癭腹大臍突號哭胃脘或成穀癥是名丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐虫

煩渴嘔噦是為嘔露一者皆因脾胃久虛不能消化水穀不榮血氣致肌肉銷鑠腎氣不足復為風冷所傷榮骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾並難治宜服此藥

青皮去白

陳皮去白

蓬朮煨

白豆蔻仁

川芎

五靈脂

蘆薈

雞心檳榔略半

木香

煨煨灰

史均子肉焙略

右為細末用猪膽汁浸糕糊丸如麻子大每服二三十丸不拘時米飲送下有熱薄許湯下亦可

麝香進食丸治小兒脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌肉不榮羸瘦臟氣不宜吸吸苦熱及頭骨門解翻食吐虫煩渴嘔噦並皆治之

麝香另所

當歸酒洗

枳殼去穢麩

木香炮

代赭石煅

硃砂另研各

巴豆去油

右為末麪糊丸如麻子大每服三五丸食後姜湯送下

痰癖丸治小兒穀癥等證

青皮去白

木香

蓬朮

代赭石煅細

五靈脂去炒

大黃各二

巴豆去油

右為末醋糊丸如麻子大每服三五丸食後姜湯送下

○鶴膝

錢氏地黃丸治小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈

露如鶴之膝

熟地黃

八錢

山茱萸

乾山藥

冬明

澤瀉

白茯苓

去皮

牡丹皮各三

加梔茸

酥炙

川牛膝各二

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服三歲已下一丸三歲

已上二丸空心溫水化下

○ 痧症瘴氣

木香丸治小兒瘴痧疳積

木香

蓬朮

砂仁

青皮

代諸石

煨研 硃砂 二細各

大丁香

川巴豆

紙壓去油各一

右為細末和勻飛白麵糊為丸如麻子大每服三五丸乳積乳汁下食傷米飲湯下不拘時服

代諸丸治小兒腹中結癖塊痛

代諸石

細研 川大黃 各半

木香

五靈脂

硃砂

驚甲 醋炙

桃仁

浸去皮 辣桂 各半

巴豆肉

去油一分半

右為細末湯浸糯米糊為丸如麻子大每服五丸姜湯下

不拘時服

五珍丸治小兒一切食積

青皮必黃

乾姜炮有

五灵脂

蓬朮各一

巴豆霜一錢

右為細末搗米飯為丸如麻子大每服三五丸米湯送下不拘時服

廣茂潰堅湯治小兒瘰癧腹有積塊堅硬如石

厚朴

黃芩

當歸

草豆蔻仁

黃連

半夏

廣茂

益智仁

紅花

吳茱萸

升麻各二

生甘草

柴胡

澤瀉

神麴

青皮

橘皮各三

如渴加葛根四分

右作一服水一鍾先浸少時煎至六分食前服

木鱉膏貼小兒瘰

木鱉子去腹獨標

雄黃各半

右件同并為膏入醋少許攤於蠟紙上貼患處

○腸滿積聚

肥氣丸治肝之積在左脇下如覆盆有頭足如蠶收久不愈發疾瘡嘔吐其脉弦而細

當歸頭

蒼朮

各半

青皮

炒

蛇含石

煨

各半

莪朮

三棱

鉄胤粉

各三

及

三

後

木

右為末醋煮米糊為丸如麻子大每服四五十丸食遠用當歸浸酒送下

息膏湯治肺之積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脉浮而毛

半夏

湯洗

吳茱萸

湯洗

桂心

人參

甘草

桑白皮

炙

葶藶

各二

右剉碎每服五錢水一鍾生薑五片棗二枚煎至五分食

前溫服

散聚湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發依有時心腹絞痛
攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏

湯洗七次

檳榔

當歸各七

陳皮

去白

杏仁

去皮尖

桂心

各二

茯苓

甘草

炙

附子

泡去

川芎

枳殼去白

厚朴

姜製

吳茱萸

湯炮洗各一

右劉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服如大便不

利加大黃

伏梁丸治心積起於臍上至心大如臂久不愈病煩身熱脾股

皆腫環臍而痛其脉沉而訕

茯苓

厚朴

人參

枳殼

去白

白朮

半夏

湯泡

三棱

各等分

右為末水煮麵糊為丸如麻子大每服二三十丸米飲不
拘時服作散酒調服亦可

痞氣丸治脾積在胃脘舊大如盤久不愈病四肢不收黃痺飲
食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脉浮大而長

大烏頭炮去皮洗 附子炮 桂心各半

赤石脂煨醋 川椒炒出 乾姜炮各

右為細末煉蜜為丸如麻子大珠砂為衣每服一二十丸
不拘時用米湯送下

奔豚湯治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久
不愈病喘逆骨疼少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙乾 葛根冬一兩 當歸 川芎

白芍藥 甘草炙 黃芩略二 半夏湯洗七次

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片煎至六分不拘時服

天七氣湯治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疔
痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

蠶智仁

陳皮去白

京三棱

蓬朮

青皮去白

桔梗去芦

肉桂不見

藿香葉各一兩半

甘草炙七

香附子炒去毛

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食前服

香稜丸治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

木香不見

丁香各半

京三棱酒浸枳殼去穢

青皮去白

川練子剉炒茴香炒各一兩

蓬朮

一兩切細去白皮已用三十

右為細末醋煮麵糊為丸如麻子大硃砂為衣每服二十
丸炒生薑鹽湯下溫酒亦可不拘時服

○腹痛

四順清涼飲治小兒熱證腹痛血熱蘊結壅滯

大黃味壯赤芍藥當歸甘草微炙

加青皮炒殼各等分

右為粗末每服三錢水一鐘煎至五分不拘時服

指迷七氣湯治小兒冷證腹痛面青四肢冷

辣桂青皮陳皮桔梗

三棱蓬義木養育益智仁略一

香附子半一兩甘草炙加半夏製各七

右為粗末每服三錢水一鐘生姜三片紅棗一枚煎至五

分調和化蘇合香丸不拘時服

蘇合香丸治小兒卒暴心腹疼痛亦能順氣化痰驚搐壅滯時

方見氣門

當歸散治小兒胎寒腹痛面唇青身溫肢冷多啼

當歸炒

黃芪炙

北細辛去七

肉桂去皮

陳皮去白

白姜炮

縮砂仁

甘草炙

右劉淨每服五錢水一鍾生薑三片糯米五十粒煎至五分空心服

立積散治小兒中寒腹痛手足厥冷寒顫口噤暈悶口吐涎沫不能啼哭

白芷

川芎

甘草炙

茯苓去皮

當歸去芦

肉桂去皮

芍藥各三

陳皮去白

枳殼去穢

麻黃去根節

厚朴

桔梗去穢

蒼朮

乾姜炮

半夏

加附子炮

吳茱萸各

右為末每服五錢水一鍾半生薑三片紅棗二枚煎至

七分半同服不拘時

一方用食鹽同茱萸炒裝絹袋內熨兒臍腹上下

○心痛

釣藤膏治小兒稟受虛怯邪干心痛及內吊夜啼面唇青今

乳香朋心五靈脂

沒藥

當歸各

麝香一字

右為末煉蜜為丸如豌豆大百日内兒一九煎釣藤湯化
下一歲二九三歲三九或乳香湯化不拘時服

乳附九治小兒胃冷腸寒心腹疼痛便清泄瀉啼叫有汗

附子炮天

乳香

當歸

訶子地去核

桂心

乾姜炮

吳茱萸各等

右為末酒糊為丸如麻子大每服三十九吊藤湯或米湯
食前送下量兒大小加減與服

蓬仙凡治小兒心腹刺痛

桂心 去皮

乳香

蓬莪朮 炮各五錢

右為末酒糊為丸如麻子大一歲兒服二三十丸食前釣

藤湯下量兒大小加減

參香丸治小兒心腹疼痛及腸冷便青

乳香

木香

石菖蒲

人參

良薑 炒各

右為末酒糊丸如麻子大一歲兒十九食遠米飲湯下量

兒大小加減

化虫丸治小兒虫咬心痛來去不定不思乳食

鶴虱 炒

檳榔

胡粉

苦練根 各半

白礬 生拌火

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三五十丸用溫漿水

入油三五滴食前下有小虫皆化為水大虫自下月初服

甚妙

安虫丸治小兒虫咬心痛因上焦中焦虛冷胃寒所作

乾漆炒 雄黃半錢 巴豆二錢

右為末白糊為丸如麻子大三歲兒三十丸煎石榴根湯食前送下量兒大小加減

遣虫丸治小兒虫動心腹痛啼叫口吐涎沫

攪榔 蕪荑去皮 雷丸 定粉

鶴虱各等分

右為末煎苦練根湯調白麵打糊為丸如麻子大每服三十丸食前虫均子湯送下千金方云虫攻下部燒艾葉烟熏之

○浮腫

實脾散治陰水腫用此先實脾上

厚朴去皺

白木

木瓜去穢

木香不見火

乾姜炮

草果仁

大腹子

附子炮去

甘草炙

白茯苓去破各

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗一枚煎至五分

不拘時服

大橘皮湯治小兒濕熱內攻心腹脹滿并水鍾小便不利大便

滑泄

橘皮去白

茯苓去皮

木香

甘草各半

檳榔三升

滑石大兩

白朮

猪苓

澤瀉

肉桂各半

右剉碎每服三錢生姜三片煎至六分不分不拘時服

藜蘆木香散治暑濕傷脾水鍾腹脹小便赤大便滑

藜蘆

木香

茯苓

肉桂

滑石

猪苓

澤瀉

木通

牛草

白朮

各等分

右為末每服一錢不拘時白湯調下

二物湯治小兒患氣急積久不瘳遂成水病攻面且身從腰以

上腰腫出當發汗

麻黃

去節

甘草

五分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分不拘時服

牡蠣散治大病差後腰以下有水氣者

牡蠣

煨

澤瀉

蜀漆

洗炒

商陸

葶藶

海藻

括樓根

各等分

右為末每服一錢用燈心煎湯調空心服量兒大小加減

牛丸治小兒疳氣頭面浮及四肢腫

黑牽牛

半生

白牽牛

半生

青皮

陳皮

各等分

右為末麵糊為丸如麻子大每服三十九不拘時米湯送下此小腫常服自消

五皮散治小兒諸般浮腫氣急可食

桑白皮

大腹皮

茯苓皮

陳橘皮

姜皮

各等分

右剉碎每服五錢水一鍾紫蘇三五葉煎至五分不拘時服瀝寮方用五加皮地骨皮

內消丸治小兒頭面手脚虛腫

丁香

十四粒

木香

炮一

青皮

去穰五個

防風

巴豆

去殼七粒

右青皮并碎同巴豆炒黃去巴豆不用將青皮碾米入餘藥末內和勻用麵糊為丸如麻子大每服二三十丸不拘時男孩兒橘皮湯送下女孩兒艾葉湯送下

瀉氣散治小兒一切浮腫

木香

赤小豆

陳皮

蘿蔔子炒細研

甘草炙各五分

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片紅棗二枚煎至五分

不拘時服量兒大小加減

○腹脹

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不能收四

肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦沉厥

益智

半夏

木香

茯苓

升麻各七

川烏炮去

人參

青皮

當歸

生姜

柴胡

乾姜

葶藶

黃連各半

黃芪

吳茱萸

車豆蔻面裹

厚朴

黃蘗各一

一方有麻黃

各二

冷硬物

中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹

妙去腐

人參

去岁

白朮

姜黃

去
妙

半夏

湯炮

積實

之鼓炒

黃緒

琴瑟

黑

一灸各

白袂

卷五

縮砂

乾生

望來客

1

一義
刃製

知母

判例
判例

澤瀉

陳皮

三去不攘

各

右各味為細末和勻水浸蒸餅為丸如麻子大每服五十

丸用白湯不拘時服

四炒丸治小兒氣血凝滯腹內鼓脹

炒黃耆

白木

五十分

葡萄子四

一
一

一、同子
一、炒用

黃去

羅蘭

得同

一分展轉傳一冊同於黃去乾錄一分用苗香一兩
同如黃法苗香不用止用叙發張為極細末

右用同妙蒼朮等四味藥用水三碗煎至一碗去滓將蒼朮等藥汁煮麵糊為丸如麻子大每服五十九食遠用米飲湯送

消氣丸治小兒疳腹脹喘急并面浮腫

丁香

胡椒

炒各半

羅蔔子

炒

白牽牛

生各五

右為細末白麵糊為丸如麻子大三歲兒三十九食前用米湯送下量兒大小加減

消氣丸治小兒疳氣腹脹喘急

木香

二分半

羅蔔子

五分同巴豆三分半

炒黃色去巴豆不用

右為末麵糊為丸如麻子大每服二十九不拘時米湯下

量兒大小加減

導氣丸治小兒腹脹氣急

京三棱

青皮

羅蔔子

炒

皂角

酥炙

生者

黑牽牛

各生半炒

右為末麵糊為丸如麻子大每服二三十丸不拘時用米

湯送下

○口瘡

瀉心湯治小兒心臟積熱薰蒸上焦口舌生瘡

宣黃連

去鬚

右為細末每服一字至半錢或一錢臨睡白湯調下

七寶洗心散治小兒壯熱煩燥風熱上壅心經積熱口舌唇燥

眼眵多淚大小便秘澀

大黃

溫熱

甘草

炒

當歸

酒洗

麻黃

不去

芍藥

荊芥穗

名二

白朮

三分二

右為粗末每服三錢水一鍾生姜二片薄荷三葉煎至五

分食後服

凉膈散治小兒臟腑積熱口舌生瘡

連翹

枳殼

黃芩

川大黃

朴硝

梔子

薄荷葉

各等分

右剉碎每服五錢竹葉五葉蜜少許煎至五分食後服

大連翹飲子治小兒上焦壅熱口舌生瘡小便赤澀

連翹

瞿麥穗

滑石

牛旁子炒研

車前子

赤芍藥醋一木通

山梔子

川當歸

防風各半

黃芩

荊芥穗各一兩

柴胡去芦

甘草炙各二兩

蟬蛻去足二

錢半

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

瀉黃飲子治小兒風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼去白

炒

黃芩

防風去芦

半夏湯洗

七次

石斛各一

兩

甘草半兩

右剉碎每服五錢水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服
柳花散治小兒口舌生瘡

玄胡索

黃連

黃蘗

青黛另研

蜜陀僧

另研各

右為細末每用少許貼口瘡上有津液吐出頻用不拘時
一方治小兒心有客熱滿口生瘡

一方用天南星末醋調貼兩脚心有疔吳茱萸末米醋調塗可

一方

用黃連細末以蜜水調抹口中患處

一方

用黃柏末青黛等分腦子少許另研入藥以水調抹乾瘡亦可

○眼疾

小防風湯治小兒熱毒眼患

大黃蒸 山梔子 甘草炙 赤芍藥

川當歸洗 防風 羌活各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後用

小沅氣飲治小兒風毒眼患

蟬蛻去足 甘草 羌活 天麻

川當歸 防風 大黃 赤芍藥

薄荷 杏仁各等分

右剉碎每服五錢水一鍾煎至五分食後服

生熟地黃湯治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及至開眼

有如內障朦朧失所

生乾地黃洗 熟乾地黃洗各一兩 麥門冬去心

川當歸 枳殼米泔浸一宿炒各二錢半 杏仁湯泡去皮

防風 甘草 赤芍藥各二

右剉碎每服五錢水一鍾黑豆七粒煎至五分食後服
小菊花膏治小兒積毒眼患

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

蒼朮

米泔浸

荆芥穗

防風

右等分為末煉蜜為膏如小指大每服一餅細嚼白湯化
不拘時服

密蒙花散治小兒瘡痘并諸毒患服

密蒙花

二錢

青箱子

決明子

車前子

各半

右為末羊肝一葉批開作三片摻藥令勻仍合作一片用
濕紙七重裹於灰中煨熟空心食之

牛黃丸治小兒失誤藥打觸着頭面額角蕪倒撲令兒肝受驚

風遂使兩目睛開名曰通睛

牛黃

白附子

肉桂

全蝎

芎藭

軟石膏

煨過各二斤半

白芷

藿香

五錢

硃砂

二錢

麝香

二斤半

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一九薄荷湯化食後服
通頂散治眼疼風熱腫脹作楚

瓜蒂

藜蘆

各一

皂角肉

半錢

麝香

少許

右為末每用少許吹入鼻中

○鼻

貼顙通關膏治小兒被乳母鼻息吹着兒顙令兒鼻塞不吃乳

荆芥

一兩

香附子

炒

白僵蚕

各半

猪牙皂角

二斤

川芎

一兩半

細辛

五錢

右為細末用葱白研爛入煎藥末研勻捻作餅貼顙門上

消風散治鼻塞胃運頭目不清

人參

川芎

羌活

白茯苓

白僵蚕

藿香葉

防風

荆芥穗

甘草炒

蟬殼各

厚朴製

陳皮各二

右為細末每服一錢或半錢食後用防風荆芥湯調服

辛夷散治肺虛為四氣相干鼻內壅塞涕出不已氣息不通

川芎

木通

防風去芦

甘草炙

辛夷仁

細辛去土

藁本去芦

升麻

白芷各等分

右為細末每服一錢食後茶清湯調服

噉化筆澄茄丸治小兒鼻塞不通

筆澄茄

半兩薄切

荆芥穗一

右為末煉蜜丸如芡實大每服一丸噉化津嚥如小噉不

得用薄切湯磨化服不拘時

○時耳

犀角飲子治小兒風熱上壅兩耳龍閉內外腫痛膿水流出

犀角

葛蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆

炒

甘菊花

去核各一兩甘草半兩

右判碎每服五錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服
龍骨散治小兒聾耳膿出不止久不瘥成聾耳也

龍骨一錢

黃丹

炒七分

枯礬一升

麝香少許

胭脂四分

右同研令細先以綿拭子擦去耳中膿用竹筒納藥少許
吹入耳內勿令風入本方加海螵蛸半錢亦妙

花胭脂膏治小兒聾耳常出膿水不止

花胭脂

白龍骨

枯礬

白石灰各一

右研如粉用蒸棗和丸如棗核大以綿裹一九塞耳中日
三換之

紅綿散治小兒聾耳出膿及黃水

白礬煨一胭脂一字麝香少許

右為細末研勻用綿杖子擦去耳中膿水用竹筒納藥少許吹入耳中

○脫肛

敗毒散治小兒風邪入大腸脫肛墜下

方見前

養臟湯治小兒久痢臟寒肛門出不收

五倍子 白礬 蛇床子各等分

右為末水煎浸洗洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉葉上頻用托入

蟬皮散治小兒肛門或因洞泄或因用力過多脫出不收

蟬皮一錢磁石煨碎桂心各半

右為末每服一錢空心米飲調下

香荊散治小兒脫肛

香附子

炒一兩半
法手

荊芥穗二兩

右為末每用五錢水一大碗煎熟淋洗

又方

用單麻子四十九粒研爛水調作餅子貼頂門上即收

○陰癰

菜萸內消丸治小兒陰癰偏大上攻臍腹疔痛膚囊腫脹或生

瘡瘍時出黃水

川練

炒一兩半

大腹皮

五味子

海藻

洗

玄胡索

各一兩半

茴香

炒

桂心

川烏

炮去

吳茱萸

桃仁

研

食茱萸

各五

木香

半

桔梗

青皮

山茱萸

各一

右為細末酒糊為丸如麻子大每服三十九空心溫酒送下
當歸散治小兒癩疔

牽牛微炒取仁 辣桂各半 當歸 大黃各半

全蝎半錢 桃仁浸去皮尖

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食前服以
利為度

川練散治小兒癩疔小腹痛引腰脊攣曲身不能直

木香 檳榔 三棱 蓬朮炮

青皮去白 陳皮去白 川練肉 羌花米醋浸炒

辣桂 牽牛生取仁 巴豆不去油

右為細末飛麵糊為丸如麻子大每服三九空心用生姜

湯送下

牡蠣散治小兒外腎腫大莖物透明

牡蠣粉 二錢 乾地龍 一錢

右為細末用津唾調傳外腎熱者雞子清調傳

○陰瘡

木通散治小兒小疳蘊熱濕毒邪于留熱於膀胱故生陰瘡

木通 去皮

篇蓄 去梗各五錢

大黃

赤茯苓 去皮

甘草 各三錢

瞿麥 去梗

滑石 末

山梔仁

車前子

黃芩 各二錢

右剉碎每服五錢水一鍾燈心十根薄荷五葉煎至五分食前服

臘茶散治小兒陰囊生瘡疼痛水出又不瘥

臘茶

五倍子 各五錢 膩粉 少許

右為末先用葱拊湯洗然後用香油調貼

一方治陰囊生瘡疼痛

右先用川椒荊芥槐枝柳枝蛇床子煎湯洗後用朴硝為末雞子清調敷

一方治陰生瘡不乾

右用烏賊骨為細末乾貼瘡患處

一方

用紫蘇葉煎湯淋洗及作末貼之妙

一方治小兒陰瘡不乾

右用輕粉密陀僧為末貼之如痒加山梔子訶子燒存性研同前藥為末先將米泔水洗瘡淨然後敷貼此藥

○天釣

釣藤飲治小兒天釣風潮熱四肢抽掣

釣藤

人參

犀角

甘草

全蝎

天麻

右為龍末每服一錢半水一鍾煎至四分不拘時服
釣藤飲治天吊風搐

釣藤 犀角 天麻各七 全蝎五箇

木香 甘草各五

右作一服水一鍾生姜三片煎至五分不拘時服

釣藤飲子治驚風天吊卒然驚悸眼目翻騰

釣藤炒五 麻黃去節 甘草炙各三分 天麻

川芎 防風 人參各七分 全蝎炒去毒五箇

僵蚕炒七箇

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

牛黃丸治小兒一切驚風五癇天吊客忤痰涎四肢抽掣

白花蛇酒浸 白附子 全蝎 川烏一隻重半又生用去皮

天麻 薄荷葉各半 已上六味先為細末次入

雄黃

半斤

辰砂

三斤

牛黃

一斤

麝香

片腦

各半斤

右件為細末一處和勻麻黃去節二兩酒一升煎麻黃至一盡去麻黃用酒入蜜少許熬成膏劑前藥末為丸如芡實大用金箔為衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散邪

塗頂膏治天吊風備急

烏頭

生用去

芸薹子

各二

右為末每用一錢新汲水調敷兒頂上

天漿子散治小兒天吊驚風

天漿子

炙

犀角屑

丹砂

雄黃

另研

附子

法安

白附子

半夏

水銀

另研

乳香

另研

白殭垂

膩粉

另研

小黃

另研

各

麝香

另研

銀箔

五片

石為細末和勻每服一字用薄荷湯調下量兒大小加減
青黛丸治小兒天吊客忤五癇八痢十二種驚癇

青黛

天竺黃

乾蝦蟆

一箇黃泥包裹燒赤

乾蝟牛殼

黃連

人參

地龍

去土

鈞藤

龍膽草

各半

蘆薈

熊膽

各半

牛黃

麝香

雄黃

丹砂

各一錢

夜明沙

去土

胡黃連

各三錢

右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三九空心米飲湯

送下

再生散治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥冷

烏蛇

天絲

南星

全蝎

去毒各

麝香

五

大砂

二升

牛黃

另研

白附子

地文

右為細末和勻

錢煎金銀 奇湯調下量兒大

服

三白散治小兒盤腸氣吊先服此藥後服

白牽牛炒一兩 白木炒

四片皮 陳皮

木通各三字

右為細末每服半錢用茶煎湯調不拘時服

釣藤膏方見心痛類